

Zylerer.
Rivigo

UNION
DES
SOCIÉTÉS FRANÇAISES
D'HISTOIRE NATURELLE

C A Ruel

- Bulletin Trimestriel -
N° 18 : Juillet 1954

SECRÉTARIAT : 35, Rue Saint-Charles, VERSAILLES

LISTE DES SOCIÉTÉS PARTICIPANTES

INDICATIF ET DÉSIGNATION DES SOCIÉTÉS

NOMS ET ADRESSES DE LEUR DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE GESTION

1° SOCIÉTÉS FONDATRICES

SSO. *Société des Sciences Naturelles de Seine-et-Oise*
M. GOMBAULT, 4 bd de la République, Versailles.
COTISATION: Membres actifs, 400 fr.; Etudiants, 250 fr.
à adresser à: *Société des Sciences Naturelles de Seine-et-Oise*, 1, rue Carnot, Versailles. — C.C.P. Paris 5060-56.

BCO. *Société Botanique du Centre-Ouest*
M. RALLER, 58, rue des Mathias, La Rochelle
(Charente-Maritime).

COTISATION: 300 francs à adresser à *Société Botanique du Centre-Ouest*, Les Brosses, par Sauzé-Vaussais (Deux-Sèvres). — C.C.P. Bordeaux 215-79.

HNA. *Société d'Histoire Naturelle de l'Aisne*
M. BASQUIN, 5, rue de Bellevue, St-Quentin (Aisne)
Pour les cotisations se reporter au bulletin d'information.

HNC. *Société d'Histoire Naturelle du Creusot*
M. GOURBEAU, 53, rue Maréchal-Foch, Le Creusot
(Saône-et-Loire).

COTISATION: 250 francs à adresser à *Société d'Histoire Naturelle du Creusot*. — C.C.P. Dijon 459.32.

(à suivre 3° page de couverture)

SOCIÉTÉ D'ÉTUDE DES SCIENCES NATURELLES DE REIMS

Le Fichier Entomologique Départemental

par M. CARUEL, à Villers-Allerand

(Voir Bulletins numéros 7, 10, 12, 13, 14, 15 et 16)

SEPTIÈME NOTE

J'ai le profond regret de signaler le décès de M. S. Le Marchand qui voulait bien mettre son incomparable connaissance des microlépidoptères au service de nos modestes travaux. Je l'ai rencontré le jour même où la maladie qui devait l'emporter allait s'appesantir sur lui et alors qu'il venait de déterminer sous mes yeux la plupart des microlépidoptères qui figurent dans la liste ci-dessous: c'est un collègue charmant, distingué, d'une affabilité et d'une servabilité à toute épreuve qui disparaît: sa perte sera ressentie cruellement.

J'ai eu par contre le vif plaisir d'intéresser à nos travaux les spécialistes suivants: MM. Jacques Aubert, de Lausanne, et son homonyme, Jacques Aubert, de Paris, Carayon, Dewailly, Roudier et Weil également de Paris, d'Aguilar, de Versailles, Ribaut, de Toulouse, et Schaefer, de Montpellier.

Grâce au précieux concours qu'ils nous apportent, concours désintéressé et amical dont je les remercie vivement, le champ de nos travaux va encore s'élargir et toucher, en particulier certaines familles habituellement délaissées.

Rectifications à apporter aux publications antérieures: Bulletin n° 15 de 1953, page 96: Curculionides: supprimer O. Lugdunensis Boh qui n'est plus considérée comme espèce distincte mais seulement comme une ssp de O. Clavipes Bond.

Bulletin n° 16 de 1954, page 32: Eucosma bilunana Haw a été transportée à tort par l'imprimeur dans les Tortricides alors qu'il était correctement classé dans les Eucosmides.

Nouvelles abréviations employées: Noms de chasseurs: Worms (Ws), Molez (Mz), Variot (V).

Noms de communes: Beine: Be. Barbonne-Fayel: BF. Cauroy-les-Hermonville: CH. Courey. Cr. Chatrices: Cs. Hautvillers: Ht. Pargny: Py. Sept-Saulx: SS.

COLEOPTÈRES

Scarabaeides

Oniticellus fulvus Gz. Le Thoult-Throsnay. Va (Ws).

Buprestides

Anthaxia candens. Pz. Ec.

Cerambycides

Leptura sanguinolenta. L. Cor-
micy (M). *Pogonochaerus decoratus*.
Fairm. Ec.

Chrysomelides

Lochnmaea suturalis. Thoms. *Cassida pusilla*. Walll. Ec.
Ec.

DIPTÈRES 157 + 117 = 274.

Cecidomyiides 26 + 6 = 32.

Cystiphora taraxaci. Kiet. *Perrisia beckiana*. Mik. Bas-
Souain (1). lieux les F.
Jaapiella thalictri. Rubs. Som-
me-Tourbe. *Perrisia bryoniae*. Bouc. Poix.
Monarthopalpus buxi. Lab. *Perrisia stachydis*. Bremi. Cou-
péville. péville.

Bibionides 2 + 2 = 4.

Amasia funebris. Meig. SI *Diliphus febrilis*. L. SI. Va,
etc...

Stratiomyiides 11 + 3 = 14.

Pachygaster atra. Pz. Va. *Beris vallata*. Forst. Tinquex.
Microchrysa flavicornis. Meig. Ec.

Rhagionides 1 + 2 = 3.

Rhagio strigosus. Meig. Va. *Chrysopilus auratus*. F. Cg.
Ry, etc...

Tabanides. 6 + 6 = 12.

Straba bromius. L. Ry. *Sziladynus tropicus*. Pz. Bt.
Tabanus bovinus. Loew. Bt. *Theriotplexes albipes*. F. Cg.
Sziladynus solstitialis. Schin. Cy.
Cg. *Dasytippia fulva*. Meig. Va.

(1) Je dois la notation de ces six espèces à M. Noury, de Buchy (Seine-Inf.), qui les a capturées pendant la guerre 1914-1918. Je le remercie très vivement d'avoir ainsi participé à nos travaux et sou-
haite que son exemple soit suivi.

Asilides. 10 + 2 = 12.

Nusa albibarbis. Meig. Ry. SS. *Nusa atra*. Kertl. Bt. SS. (Mn).

Bombylides. 10 + 4 = 14.

Lomatia lateralis. Meig. Ec. *Bombylius minor*. L. Py.
Bombylius ater. Scop. Bt. Pp. *Bombylius variabilis*. Loew.
Ec.

Scenopinides. 0 + 2 = 2.

Omphrale fenestralis. L. Va. *Omphrale senilis*. F. Va.

Syrphides. 37 + 43 = 80.

Brachyopa bicolor. Fall. Ry. *Pipiza fasciata*. Meig. Cg. Ry.
Va. *Ceroides subsestilis* Latr. Bf. *Pipizella carbonaria*. Meig. Ry.
Chilosia canicularis. Pz. Ry. *Pipizella virens*. F. Cg. Ec.
Chrysogaster chalybeata. Meig. Ec. *Platychirus albinus*. F. Cg.
Va.

Chrysogaster solstitialis Fall. *Platychirus clypeatus*. Meig.
Mo. Va. NA.

Chrysotoxum cautum. Harr. *Platychirus peltatus*. Meig. Cg.
Va. *Platychirus scamus*. Stogg.
Mo. Ec. Ry. Va.

Eristalis pertinax. Scop. Cg. *Platychirus scutatus*. Meig. Ry.
Mo. Ec. Ry. *Eristalis sepulchralis*. L. Cg. *Pyrophæna rosarum*. F. Ry.

Eumerus ornatus. Meig. Ec. *Syrphus albostriatus*. Fall. Ec.
Cv. Jy. *Eumerus tarsalis*. Lw. Be. Mé. *Syrphus bifasciatus*. F. Ry. Va.

Eumerus tricolor. Meig. Be. *Syrphus cinctus*. Fall. Ry.
Helophilus frutetorum. F. Cg. *Syrphus corollae*. F. Sa. Va.

Helophilus pendulus. L. Cs. *Syrphus luniger*. Meig. Ec.
Ry. *Syrphus nitidicollis*. Meig. Ry.

Helophilus versicolor. F. Cg. *Syrphus torvus*. O. Sack. Ry.
Leucozona lucorum. L. Cg. *Syrphus venustus*. Meig. Cg.

Litogaster metallina. F. Cg. Ry. *Tropidia fasciata*. Meig. Ec.
Melanostoma scalare. F. Ry. Ry.

Merodon distincta. Palma. Ec. *Volucella inflata*. F. Ec. Ry.
Neoscia podagrica. F. Va. *Xylota lenta*. Meig. Ec. Id.

Orthoneura elegans. Meig. Mé. *Xylota nemorum*. F. Ry. Va.
Paragus bicolor. F. Bz. Bt. Va.

Etc..., etc...

Conopides. 3 + 7 = 10.

Physocephala chrysorrhæa. *Conops quadrifasciatus*. Deg.
Meig. Va. Ch. SS.

Myopa buccata, L. Cg.
Myopa testacea, L. Va.
Occemyia atra, F. Bt. Ry.
Occemyia pusilla, Meig. Py. Va.
Dalmannia punctata, F. Bt.
 Platystomides 0 + 1 = 1.
Myrmecobia rufipes, Meig. Va.
 Ortalides, 3 + 2 = 5.
Orites ruficeps, F. Cg. Ec.
 Pallopterides, 0 + 3 = 3.
Palloptera arcuata, Fall. Va.
Palloptera gangraenosa, Pz. (D).
 Rs. Va.

Ulidides, 1 + 1 = 2.

Chrysomya demandata, F. Mé.

Dryomyzides, 0 + 1 = 1

Dryomyza flaveola, F. Sm.

Trypetides, 2 + 5 = 7.

Urophora quadrijasciata, Meig.
Urophora stylata, F. Baslieux Va.
 les Fismes (Noury). Bt. (C)
Urophora solstitialis, L. Va.
Oreillia jaceae, R. D. Va.
Prilophylla heractet, L. Va.

Psilides, 0 + 3 = 3.

Chamaepsila nigromaculata,
 Stro. Mé.
Loxocera ichneumonea, L. BF.
 Sl., etc...

Chamaepsila rosae, F. Be. Ec.

Tetanocerides, 3 + 2 = 5.

Tetanocera elata, F. Cg. Va.
Linna unguicornis, Scop. Va.

Helomyzides, 1 + 2 = 3.

Suillia notata, Meig. Mé.
Suillia similis, Meig. Sl.

Chloropides, 1 + 1 = 2.

Chlorops pumilionis, Bjerk. Ec.

Muscides, 4 + 7 = 11.

Fannia canicularis, L. Va.
Phaonia scutellaris, Fall. Cg.
 Etc...
Phaonia variegata, Meig. Sl.
Ophyra leucostoma, Wied. Va.
Polietes lardaria, F. Cg.
Phaonia pallida, F. Va.
Mesembrina meridiana, L. Chambrecy.

Calliphorides, 6 + 4 = 10.

Calliphora germanorum, Vill.
 Ec.
Mitogramma germari, Meig.
 Mé. Va.

Onesia caerulea, Meig. Ec.
 Va.
Metopia leucocephala, Ros. Ec.

Larvoevorides, 20 + 7 = 27.

Compsilura concinnata, Meig.
 Sl.
Hebia flavipes, R. D. Mo.

Macquartia praefica, Meig. Va.
Erigone consobrina, Meig. Va.
Mintho rufiventris, Fall. Va.
Fabriciella ferox, Pz. Bt.

Smidtia conspersa, Meig. Ec.

Oestrices, 0 + 1 = 1.

Oestrus opis, L. Va.

EPHEMEROPTÈRES, 0 + 1 = 1.

Polymitarcides, 0 + 1 = 1.

Polymitarcis virgo, Ol. Ma. Ep., etc...

HETEROPTÈRES

Pentatomides

Geomus punctulatus, Costa.
 Ec.
Sciocoris cursitans, F. Cn.

Pileidia pinicola, M. et R. Cv.
 (L.). Mé. Mo. (C).
Sciocoris macrocephalus, Fieb. Va.

Coreides

Rhopalus conspersus, Fieb. Bt.
 Ay. Rs. (B).
Chorosoma schillingi, Schml.
Spathocera dalmani, Schil. Cv. (Col. Bell.) Ec. (C).

Berytides

Berytus hirticornis, Brul. Ec.
 Va.
Berytus signoreti, Fieb. Ec.

Lygaeides

Heterogaster affinis, H.S. Ec.
 Va.
Eremocoris podagricus, F. Bz.
Rhyparochromus chiragna, F. (D.)
 Va.

Aradides

Aradus versicolor, H.S. Bouy
 (R). Ec. (C).
Aradus betulae, L. Gm. (B.S.
 1894, p. 132).

Reduviides

Reduvius personatus. L. Rs., *Rhynocoris erythropus*. L. Sa.
etc... (J). Ev. Va. Py.

Nabides

Nabis ericetorum. Schtz. Ay. *Nabis brevis*. Schtz. Va.
(B).

Anthocorides

Anthocoris gallarum - ulmi. *Anthocoris amplicollis*. Horv.
Deg. Mé. Mo.

(A suivre.)

SOCIÉTÉ BOTANIQUE DU CENTRE-OUEST

Amédée FOUILLADE (1870-1954)

Le 31 mars 1954 s'éteignait à Royan, chez son fils où il s'était retiré depuis 1951, un botaniste dont la vie, presque tout entière consacrée à l'étude des plantes, peut être donnée en exemple aux générations plus jeunes.

Amédée Fouillade est né, d'une famille paysanne, le 25 août 1870, à Paizay-le-Chapt, dans ce sud des Deux-Sèvres si riche à la fois en plantes et en botanistes.

Entré très jeune à l'Ecole normale de Parthenay après des études à Argenton-Château, il en fut pendant trois ans l'un des meilleurs élèves. A sa sortie, après de brefs séjours comme instituteur adjoint à Brioux et à Thouars, et un an de service militaire, il est nommé à L'Absie en 1893 où il se marie en 1894. En 1902, il quitte l'enseignement et devient greffier de justice de paix à Tonnay-Charente, fonction qu'il conserve jusqu'en 1939.

Il y a toujours dans la vie d'un fervent naturaliste un choc initial qui détermine sa vocation. Je ne sais pas — et nous ne saurons sans doute jamais — quelle fut l'étincelle qui alluma au cœur de Fouillade l'amour de la botanique. Tout ce que l'on peut dire, c'est que jusqu'au dernier jour, cette

flamme ne baissa point, et si, à la fin, la mémoire défaillante se refusait à rappeler tel nom de plante, tel détail topographique, la botanique restait la grande amie de toujours.

En tout cas, dès 1896, Fouillade est membre de la Société Botanique des Deux-Sèvres, fondée depuis huit ans et alors en pleine croissance. En 1908, il est élu secrétaire et en 1909, vice-président; il le restera, à travers les vicissitudes de la Société, jusqu'à sa mort; en 1925, lorsque la société renaît de ses cendres, il est choisi comme président de la section charentaise.

Il est assez difficile de retracer la carrière d'un homme modeste vivant retiré dans sa province, loin du bruit, de l'agitation, et aussi des clans du monde scientifique où se font les renommées. Mais aussi peut-on imaginer de meilleures conditions pour l'étude minutieuse, la réflexion et la méditation? C'est dans ce cadre paisible, où la Charente roule paresseusement ses eaux limoneuses, dans la modeste maison du bord de la route, avec son jardinnet où s'acclimatent les plantes les plus inattendues, que pendant cinquante ans, Fouillade va mener une vie exemplaire d'étude et de travail. Au point de vue de la botanique, son œuvre ne fut pas polarisée sur un point exclusif, il ne fut pas le spécialiste étranger à tout ce qui n'est pas sa spécialité, et l'on peut considérer que son activité fut orientée en deux directions: la connaissance de la flore locale et l'étude approfondie des genres difficiles.

Lorsque en 1903 il arrive à Tonnay-Charente et que les loisirs de sa fonction vont lui permettre d'étudier minutieusement la riche flore de la Charente-Maritime, Foucaud agonise à Rochefort, de sorte qu'aucun contact ne peut s'établir entre deux des botanistes qui auront le plus fait pour la connaissance de cette flore. Cette malencontreuse coïncidence aura sans doute causé un tort immense à la botanique locale, car qui pourra dire jamais combien de traditions, combien de précisions topographiques Foucaud emporta dans la tombe; et si, aujourd'hui, nous en sommes encore à rechercher laborieusement les anciennes localités, il ne faut pas chercher ailleurs la cause de cette rupture. Fouillade dut donc repartir de zéro; mais, marcheur infatigable, il rayonna inlassablement autour de Tonnay-Charente, tant à pied qu'à bicyclette, et les localités classiques de Séchebec, de Cadeuil, de Châtelailon, de Fouras, etc..., eurent bien souvent sa visite, au point que d'autres moins célèbres, mais cependant non dénuées d'intérêt, furent quelque peu négligées. Mais, dans ces lieux privilégiés et préférés, on peut dire que Fouillade connaissait l'emplacement de chaque brin d'herbe, et il était pour le visiteur occasionnel un guide incomparable que la Société Botanique de France, dans