

Comme très souvent, le climat lorrain n'a pas été très favorable à une grosse activité «papillon» cette année, malgré tout, les observations ont été souvent très intéressantes.

Tout d'abord en forêt Domaniale de l'Isle (55) dans l'Argone, le Damier du frêne *Euphydryas maturna* L. est toujours bien présent. S'il a disparu de certaines zones forestières, il en a recolonisé d'autres et il semble bien installé dans les zones ouvertes et fleuries.

Sur les Côtes de Meuse, la Bacchante *Lopinga achine* Scop. est toujours aussi présente (plusieurs centaines d'exemplaires malgré les conditions météorologiques peu favorables). C'est très agréable à observer et ce qui est le plus remarquable c'est la présence de cette espèce en Forêt Domaniale de Haye (54) et je m'attacherai à regarder de plus près ce qu'il en est en 1999.

En 1997, *Brentis daphne* D. et S. avait été observé en Forêt Communale de Vaucouleurs (55) ainsi qu'à Liverdun et Marbache (54), voir article précédent.

En 1998, j'ai eu le plaisir de trouver cette espèce dans plusieurs parcelles en régénération dans les forêts de Marbache, de Domgermain, de la Reine, de Liverdun, de Haye et de Natrou (54). J'ai pu observer à chaque sortie plusieurs dizaines d'exemplaires sur chaque parcelle (environ 5 à 8 ha). J'ai pu également observer la ponte de quelques femelles sur des ronces.

Les zones que privilégie cette espèce sont des parcelles forestières en régénération, où la coupe définitive a eu lieu, et où les ronces sont présentes en tapis entre les taches de semis ou de fourrés.

En cette année 1998, un papillon a véritablement fait un tabac : *Argynnis paphia* L!

