



Quelques observations intéressantes de lépidoptères en Lorraine en 2014 (Lepidoptera, Elachistidae, Hesperiiidae, Noctuidae, Erebidae)

André CLAUDE¹

¹ 44, route de Pompey, 54460 Liverdun <lor.lepido@orange.fr>

Résumé. L'auteur signale la présence de quatre espèces de Lépidoptères intéressantes pour la Lorraine, dont *Elachista orstadii* (Elachistidae), espèce nouvelle pour la France découverte en Meurthe-et-Moselle en 2014.

Abstract. The author reports the presence of four interesting species of Lepidoptera for Lorraine, including *Elachista orstadii* (Elachistidae), new species for France discovered in Meurthe-et-Moselle in 2014.

Mots-clés / keywords. Lepidoptera, Elachistidae, Hesperiiidae, Noctuidae, Erebidae, espèce nouvelle, France, Lorraine.

Les conditions météorologiques particulièrement chaudes du printemps 2014 ont induit des émergences très précoces et peut-être favorisé l'observation d'espèces peu courantes. Ainsi les quatre suivantes méritent d'être signalées; la première est nouvelle pour la France, les trois autres sont d'observation particulièrement rare.

Elachista orstadii (Elachistidae) a été observé pour la première fois en France le 29 avril 2014 à Avrainville (54), sur une pelouse calcaire du *Mesobromion erecti*, à la centrale photovoltaïque de Toul-Rosières. (CLAUDE, 2015).

Orthosia opima (Noctuidae) a été capturé au piège lumineux sur la pelouse calcaire des Pontances à Jézainville (54), une ZNIEFF gérée par le Conservatoire d'Espaces Naturels de Lorraine. Cette noctuelle n'a été que rarement observée récemment, notamment en 1996, par

Louis Perrette à Obergailbach (57) (M. MARTIN, comm. pers.) également sur une pelouse calcaire. Considérée comme hygrophile et fréquentant les lisières boisées, elle semble ainsi apprécier les pelouses pâturées avec *Plantago media*, nourriture de la chenille, avérée selon Rudolf Bryner (site internet lepiforum.de).

Chelis maculosa (Erebidae) a été attiré par la lumière le 20 juin 2014, toujours sur la pelouse calcaire des Pontances à Jézainville (54). Jusqu'ici, l'espèce n'avait été citée de Lorraine que par Georges Oligier (M. MARTIN, comm. pers.), avec 2 chenilles sur le Plateau de Malzéville (54), en 1962 et 1963. Cet Érebidé fréquente les milieux à caractère steppique (chenille sur *Galium verum*).

Carcharodus floccifer (Hesperiiidae) très localisé et peu abondant au niveau national, découvert dans le sud du département des Vosges en 2010, à Bellefontaine (A. CLAUDE), a été observé dans le même département, mais beaucoup plus au nord, à Biffontaine, sur une prairie de fauche mésotrophe acidophile à Jonc et Scorzonère (Le Fihis), le 20 juin 2014 (chenille sur *Stachys officinalis*).

Bibliographie

CLAUDE, A., 2015. *Elachista orstadii*, N. Palm, 1943, espèce nouvelle pour la France (Elachistidae). *Oreina*, 29: 11.

RENNWALD E., RODELAND J., 2006. Lepiforum: Bestimmung von Schmetterlingen (Lepidoptera) und ihren Präimaginalstadien. <http://www.lepiforum.de/>. Publication en ligne.



Fig. 1.
Pontance
d'*Orthosia
opima* sur
*Plantago
media*.
Photo
R. BRYNER
(lepiforum.de).