

BIBLIOTHÈQUE
DU PROF. DEAU
TOULOUSE

CATALOGUE

DES

HÉMIPTÈRES - HÉTÉROPTÈRES

DE L'AUBE

PAR

M. L'ABBÉ G. D'ANTESSANTY

MEMBRE RÉSIDANT DE LA SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE L'AUBE
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE
ET DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ENTOMOLOGIE



TROYES

IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE DUFOUR-BOUQUOT
Rue Notre-Dame, 41 et 43


1891

CATALOGUE
DES
HÉMIPTÈRES - HÉTÉROPTÈRES
DE L'AUBE

PAR

M. L'ABBÉ G. D'ANTESSANTY

MEMBRE RÉSIDANT DE LA SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE L'AUBE
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE
ET DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ENTOMOLOGIE



TROYES

IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE DUFOUR-BOUQUOT
Rue Notre-Dame, 41 et 43

—
1894

CATALOGUE

DES

HÉMIPTÈRES - HÉTÉROPTÈRES

DE L'AUBE

INTRODUCTION

La faune entomologique de l'Aube a été étudiée sérieusement, dans deux de ses branches importantes : les Coléoptères et les Lépidoptères. M. Gustave Le Grand a publié en 1861 un *Catalogue des Coléoptères de l'Aube*, ouvrage bien fait et consciencieux, mais devenu insuffisant par suite des nombreuses découvertes faites depuis cette époque déjà lointaine. M. Jourdheuille, entomologiste distingué, a fait paraître tout récemment un *Catalogue des Lépidoptères de l'Aube*, œuvre magistrale et de la plus grande valeur ; j'ai donné moi-même, dans la *Feuille des Jeunes naturalistes*, une liste provisoire des Tenthredines de l'Aube ; mais je ne connais, jusqu'ici, aucun travail sur les Hémiptères de notre région. C'est cette lacune que j'ai essayé de combler dans l'opuscule que j'offre à la Société Académique.

Les Hémiptères, longtemps négligés par les entomologistes, ont été étudiés plus soigneusement depuis quelques années, grâce à l'impulsion donnée à cette branche de la science par le *Synopsis des Hémiptères-Hétéroptères de France*, de M. le docteur Puton, ouvrage excellent, clair, méthodique, facile à manier, et à l'aide duquel on arrive sans peine à la détermination du genre et de l'espèce. Malheureusement, ce remarquable travail est incomplet et n'embrasse pas la famille des Capsides, une des plus importantes et la plus difficile de toutes. Espérons que la santé de M. Puton lui permettra de la traiter aussi et de mettre la dernière main à une œuvre qui doit à jamais illustrer son nom.

Il n'y a encore en France que sept catalogues locaux d'Hémiptères, à savoir :

Catalogue des Hémiptères de la Moselle, par M. Bellevoye, 1866 ;

Catalogue des Hémiptères de l'Yonne, par M. le docteur Populus, 1874. Deuxième édition en 1880 ;

Catalogue des Hémiptères du Nord, par M. Lethierry, 1869. Deuxième édition en 1874 ; ouvrage d'une grande valeur ;

Catalogue des Hémiptères d'Alsace et de Lorraine, par MM. Puton et Reiber ; modèle du genre ; on y reconnaît la touche du maître ;

Catalogue des Hémiptères de la Seine-Inférieure, par M. Bucaille, 1887 ;

Catalogue des Hémiptères de la Somme, par M. Michel Dubois ;

Catalogue des Hémiptères de la Loire-Inférieure, par M. l'abbé Dominique.

Ces deux derniers sont de date toute récente. Celui que je publie aujourd'hui sera donc le huitième. Il est probable que d'autres le suivront et que bientôt la faune hémiptérique

française sera complètement connue. Alors il sera possible de rédiger un catalogue définitif de toutes les espèces que possède notre pays.

Depuis quinze ans environ, je me livre à l'étude et à la recherche des Hémiptères. J'ai exploré avec soin et en toute saison les environs de Troyes, particulièrement le marais de Villechétif, mine inépuisable d'insectes de tous les ordres; la vallée de la Vanne, depuis Messon jusqu'à Vulaines; les riches côteaux de Bar-sur-Seine, de Neuville, de Gyé, des Riceys, la plaine de Foolz et les landes de bruyère et d'ajoncs, près de Fouchères, la forêt de Larivour et ses étangs si intéressants, etc... Mais il y a encore d'autres régions non moins attrayantes que je n'ai pu visiter, et il est certain qu'il reste beaucoup d'espèces à découvrir dans notre département, surtout dans les deux familles des Capsides et des Hydrocorises; le champ est ouvert aux entomologistes de bonne volonté, auxquels je puis promettre une abondante récolte.

J'ai indiqué soigneusement, toutes les fois que j'ai pu le connaître, l'habitat réel des Hémiptères, c'est-à-dire la plante sur laquelle ils vivent; mais cette indication n'est pas toujours possible, car c'est souvent en fauchant dans des localités où croissent les plantes les plus diverses que l'on trouve les meilleures espèces. J'ai essayé d'y suppléer en mentionnant les habitats signalés par Fieber et par les auteurs des catalogues cités plus haut; mon travail présente un résumé fidèle de leurs observations. Souvent je signale des habitats accidentels, tels que les mousses, les écorces, les détritits des inondations, les murs, les feuilles sèches, etc... Je l'ai fait à dessein, afin d'indiquer aux jeunes entomologistes les endroits où ils peuvent trouver des insectes, même pendant l'hiver, qui n'est pas la moins riche saison.

Le département de l'Aube, bien qu'il ne soit ni montagneux, ni méridional, ni maritime, nourrit d'excellents Hémiptères. J'y ai trouvé une espèce nouvelle pour la

science, *Podops calligera*, Horvath; plusieurs espèces non encore signalées en France, au moins à ma connaissance, telles que *Trapezonotus anorus*, *Brachycoleus scriptus*, *Ploiaria Baerensprungi*, dont il n'existe que trois ou quatre exemplaires dans les collections, et beaucoup d'autres très rares, telles que *Psacasta conspersa*, *Allæorhynchus flavipes*, *Aradus aterrimus*, etc... J'ai même rencontré certaines espèces presque maritimes, telles que *Ochetotethus nanus*, petit pentatomide qui habite surtout les côtes de l'Océan. L'Aube possède aussi toutes les nouvelles espèces récemment découvertes sur le gui.

Les Hémiptères que je signale présentent toute garantie au point de vue de la détermination, car j'ai soumis les espèces difficiles à MM. Puton et Lethierry, dont les noms font autorité dans toute l'Europe. Je leur adresse ici mes vifs et sincères remerciements pour leur obligeance inépuisable et leur amical concours.

Je me suis servi, pour le classement, du Catalogue de M. Puton, 3^e édition, qui résume l'état actuel de la science.

Je n'ai compris dans ce Catalogue que les Hémiptères-Hétéroptères. Je ne possède pas encore assez de renseignements sur les Hémiptères-Homoptères, ou Cicadines. J'en publierai la liste plus tard, avec un supplément aux Hétéroptères qui deviendra bientôt indispensable.

Je désire vivement que ces quelques pages inspirent à nos jeunes entomologistes la pensée d'étudier cet ordre si intéressant, qui n'est point encombrant, comme d'autres plus riches en espèces, et qui leur réserve les plus agréables surprises.

Troyes, 18 Décembre 1890.

I. — GEOCORISÆ.

PENTATOMIDES.

PLATASPIDÆ.

Coptosoma. Lap.

1. GLOBUS. *Fabr.* — Bois de Macey, Fouchy, etc. Juin. C.¹ sur les scabienses et autres plantes. D'après Foureroy et M. Puton, cet insecte vivrait sur *Vicia multiflora*.

SCUTELLERIDÆ.

Corimelaena. White.

1. SCARABÆOIDES. *L.* — Luyères, Montchaud, le Labourat, Montgoux, Fontvanne², Estissac, Troyes, etc. CC. L'hiver, sous la mousse, dans les bois de pins; l'été, sur différentes plantes. Cette espèce vit, paraît-il, sur les fleurs de Renonculacées.

Odontoscelis. Lap.

1. FULIGINOSA. *L.* — Bar-sur-Seine, val de Verrières (Vauvrères), dans une friche, entre les petites pierres; friche entre Macey et Fontvanne, en fauchant. Juin. RR.

Odontotarsus. Lap.

1. GRAMMIGUS. *L.* — Bar-sur-Seine, friches de Vauvrères, coteau près du bois de Semont; Montgoux, Vulaines, Saint-Benoît-sur-Vanne, Villacerf, bois entre Thuisy et Chenegy, Loches. Juin, juillet, août, septembre. En fauchant sur les plantes des lieux arides. AR. Sur *Poterium sanguisorba* (Delaby).

¹ EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS : C. signifie *commun*; A C., *assez commun*; CC., *très commun*; R., *rare*; A R., *assez rare*; R R., *très rare*.

² Il est d'usage d'ajouter un s au mot Vanne, dans les noms de pays où il entre. Cette orthographe ne me paraît pas rationnelle, et, après avoir consulté des hommes compétents, j'ai cru ne pas devoir l'adopter.

Psacasta. Germ.

1. *EXANTHEMATICA. Scop.* — Estissac, coteau de Beauregard; bois de Chappes, sous la mousse, novembre; bord du canal, près de Bréviandes, en fauchant sur les *Echium*, août; Villechétif, dans un tas d'herbes coupées, octobre; Romilly. RR.

2. *CONSPERSA. Fieber.* — J'ai pris un exemplaire de cette très rare espèce à Villacerf, en battant des fagots de branches de pin, en novembre. M. Puton ne cite que quatre captures de cet insecte en France.

Eurygaster. Lap.

1. *MAURA. L.* — Partout. L'hiver, sous la mousse; l'été, en fauchant sur les plantes. CC.

Var. *PICTA. Fabr.* — Aussi commune que le type et avec lui.

Var. *NIGRA. Fieber.* — Gyé-sur-Seine, Macey, Vulaines, Lusigny. Avril, juillet, août. RR.

2. *HOTTENTOTA. H. S.* — Partout. Se trouve avec l'espèce précédente et aussi communément.

Var. *PICTA.* — Cette espèce possède, elle aussi, une variété colorée comme la variété *picta* de la précédente. J'en ai pris deux exemplaires : l'un à Lusigny, en mars; l'autre à Assencières, sous la mousse, dans un bois de pins, en décembre. RR.— J'en possède aussi un exemplaire de Hongrie.

Var. *NIGRA. Fabr.* — Troyes, Estissac, Montchaud. Septembre, octobre. RR.

Graphosoma. Lap.

1. *LINEATUM. L.* — Foicy, Romilly, Rivière-de-Corps, Barsur-Seine, etc. C. Sur les grandes ombellifères, tout l'été. J'en ai même pris un exemplaire en octobre.

Podops. Lap.

1. *INUNCTA. Fabr.* — Le Labourat, Saint-Parres, dans les débris de l'inondation, novembre, décembre; Lusigny, Arcis, etc. Avril, juin. Cet insecte se trouve surtout à terre, au pied des chardons et d'autres plantes, et aussi sous la mousse, contre le tronc des arbres; sur les renoncules (*Populus*). C.

2. *CALLIGERA. Horvath.* — Espèce nouvelle. J'en ai pris un exemplaire dans le marais de Villechétif, en avril.

Cette espèce
Horvath, de
blement de
qui n'est pas
la callosité
Malgré tout
insecte, mal

1. *ATER*
Saint-Parres
des touffes

1. *LUCT*
au pied d'un

2. *BICOR*
Royale (Sai
sèches et au
plantes.

3. *DUBI*
Thouan, pi
bois de pins
juillet, octo

Presque
et le sillou
un exempla
la membra
M. Puton
établissent
nopterus, qu
Je possède
variété méle

D'après
Thesium, e
chrysum sta

4. *BIGT*
nica officina
bois de Chi

Cette espèce, décrite d'après mon exemplaire, par M. le docteur Horvath, de Buda-Pest, dans la *Revue d'entomologie*, diffère notablement de l'*inuncta* par la forme de l'appendice prothoracique, qui n'est pas élargi, mais seulement tronqué à l'extrémité, et par la callosité jaune très apparente du lobe antérieur du pronotum.

Malgré toutes mes recherches, je n'ai pas encore pu retrouver cet insecte, mais je n'en désespère pas.

Brachypelta. *Am. Serv.*

1. **ATERRIMA.** *Først.* — Bar-sur-Seine (Cartereau), route de Saint-Parres (Laverdet). RR. Cet insecte est très abondant au pied des touffes d'*Euphorbia paralias*, dans les dunes de Pornic.

Sehirus. *Am. Serv.*

1. **LUCTUOSUS.** *Mls. R.* — Droupt-Saint-Basle, dans la terre, au pied d'un orme; Villechétif, dans les détritrus de l'inondation. R.

2. **BICOLOR.** *L.* — Troyes, Montgueux, Droupt-Saint-Basle, la Royale (Sainte-Savine), Fontvanne. Mars, avril, sous les feuilles sèches et au pied des arbres. C. Beaucoup plus rare, l'été, sur les plantes.

3. **DUBIUS.** *Scop.* — Arconville, sous des pierres; bois de Thouan, près de Gyé-sur-Seine; friche au-dessus de Fontvanne; bois de pins près de la gare de Messon, au pied d'un pin. Juin, juillet, octobre. R.

Presque tous les exemplaires de l'Aube ont la membrane blanche et le sillon transversal du pronotum profond (*S. dubius*). J'en ai un exemplaire de Dijon et un autre de Fontvanne qui ont aussi la membrane blanche et le sillon du pronotum très superficiel. M. Puton dit que les exemplaires ainsi conformés sont rares et établissent le passage entre le type *S. dubius* et la variété *melanopterus*, qui a la membrane noire et le sillon transversal très léger. Je possède deux exemplaires de Nice qui appartiennent bien à la variété *melanopterus*.

D'après M. Puton, le type *S. dubius* vit, dans les Vosges, sur un *Thesium*, et la variété *melanopterus*, dans les Landes, sur *Hedychrysium stachas*.

4. **BIGUTTATUS.** *L.* — Lusigny, bois près de la gare, sur *Betonica officinalis*; bois de Macey, sous la mousse, Montchaud; Étissac, bois de Chialot; bois près de Bucey-en-Othe. Juillet, octobre.

Gnathoconus. Fieber.

1. ALBOMARGINATUS. *Goez.* — Somsois¹, bois du château, sous la mousse d'un tronc d'arbre, mars. RR. Vit, d'après Fieber, sur *Clematis erecta*, plante étrangère à notre région. Il habite aussi probablement sur *Clematis vitalba*, qui est abondante à Somsois. D'après Robineau-Desvoidy (Cat. Populus), la larve se trouve dans les joncs et les renoncules aquatiques.

2. PICIPES. *Fall.* — Un exemplaire encore immature, et plusieurs larves sous la mousse recouvrant un petit rocher, au bord de la Nauxe, à Villenauxe. RR.

Ochetostethus. Fieber.

1. NANUS. *H. S.* — Jardin du Petit-Séminaire, Montgueux, La Royale, Bucey-en-Othe, bois de pins en face de la gare de Messon, Droupt-Saint-Basle, Estissac; sous la mousse et au pied des arbres. Février, mars, mai, juin, octobre. R. Cette espèce est considérée comme méridionale et surtout maritime, et il est fort curieux qu'elle se trouve assez fréquemment dans l'Aube. Je l'ai prise aussi à Clisson (Loire-Inférieure), localité assez éloignée de la mer.

Sciocoris. Fallen.

1. MACROCEPHALUS. *Fieber.* — Bar-sur-Seine, en fauchant dans une prairie près du bois de Semont, juin; en certain nombre.

2. MICROPTALMUS. *Flor.* — Foicy. Mai. RR.

3. HOMALONOTUS. *Fieber.* — Petite île à l'entrée du Pont-Hubert, sous les détritiques desséchés de l'inondation. R. Cette espèce est surtout méridionale.

4. TERREUS. — Bar-sur-Seine, Vauvrères, entre les petites pierres, sur une friche. Avril. R.

Ælia. Fabr.

1. ACUMINATA. *Lin.* — Partout; l'hiver, sous la mousse, dans les bois de pins et au pied des genévriers; l'été, sur les plantes. CC.

¹ Localité de la Marne limitrophe de l'Aube, dans laquelle j'ai beaucoup chassé et que je comprends dans mon Catalogue.

2. *ROSTRATA*. *Bohm.* — Avec la précédente. Montchaud, Montgueux, Bar-sur-Seine, Rigny-la-Nonneuse, etc. C.

Neottiglossa. Curt.

1. *INFLEXA*. *Wolff.* — Fouchy, marais de Saint-Lyé, Lusigny, bois près de la gare, en fauchant dans une allée herbue; Macey, Saint-Benoît-sur-Vanne, Villechétif, etc.; en fauchant sur les plantes. Mai, juin, juillet. A R.

2. *LEPORINA*. *H. S.* — Lusigny, bois près de la gare, et beaucoup d'autres localités. Tout l'été. C. Sur le genêt à balais (Puton), sur *Hieracium pilosella* (Robineau-Desvoidy, Cat. Populus); sur *Stachys sylvatica* (Lethierry).

Eusarcoris. Hah.

1. *ÆNEUS*. *Scop.* — Fouchy, Lusigny, bois près de la Gare, etc.; en fauchant sur différentes plantes. A C.

2. *MELANOCEPHALUS*. *F.* — Lusigny, bois près de la gare; Bar-sur-Seine, au bord de la Seine, en face de Merrey, Foiey, Somsois; sur *Stachys sylvatica*. Mai, juin. A R. Aussi sur les scrophulaires (Lethierry).

Rubiconia. Dohrn.

1. *INTERMEDIA*. *Wolff.* — Lusigny, bois près de la gare, en fauchant sur les grandes herbes; Bar-sur-Seine, sous la mousse d'un tronc de chêne; Fouchères. Mars, juillet. R.

Peribalus. Mls. R.

1. *VERNALIS*. *Wolff.* — Lusigny, Montgueux, Macey, Saint-Benoît-sur-Vanne, le Prédillon, etc.; en fauchant. Avril, juin, octobre. C C.

2. *SPHAGELATUS*. *F.* — Bar-sur-Seine, forêt de Bois-Bréard; en battant des fagots de chêne, novembre. R R.

Carpocoris. Kolen.

1. *FUSCISPINUS*. *Bohm.* — Montgueux, Saint-Martin-la-Fosse, Fontvanne, etc.; l'hiver, sous la mousse; l'été, sur les plantes. C C.

2. *NIGRICORNIS*. *F.* — Lusigny, Montgueux, etc.; en battant les pins et autres arbres; l'hiver, sous la mousse. J'en ai pris plusieurs fois une variété entièrement rouge. C C.

3. *LYNX. F.* — Espèce surtout méridionale, abondante à Saint-Martin-la-Fosse, en août, sur la carotte sauvage (*Daucus carotta*). Elle n'est pas rare dans la Marne, en fauchant dans les champs arides.

4. *BACCARUM. L. Verbasci de G.* — Partout; l'été, en battant les arbres; l'hiver, sous la mousse. C.C.

Palomena. M. R.

1. *VIRIDISSIMA. Pod.* — Saint-Benoît-sur-Vanne, août; Somsois, avril; plaine de Foolz, juin; Estissac. R.

Var. *SIMULANS. Puton.* — Bar-sur-Seine. Février. R R.

2. *PRASINA. L. DISSIMILIS. F.* — Jardin du Petit-Séminaire, murs de Saint-Martin; Montgueux; jardin du Lycée, etc. C.C. Accouplement au commencement de mai. Le ♂ est plus petit, d'un rouge vif en dessous; la ♀ est plus grande, souvent d'un vert pâle en dessous, mais le segment génital est toujours rouge ou orangé.

Var. *SUBRUBESCENS. Gorski.* — Avec le type et presque aussi commune.

Ces deux espèces se ressemblent beaucoup et sont souvent confondues. Les caractères qui les distinguent sont peu saillants, mais constants. La *P. viridissima* diffère de sa congénère par le troisième article des antennes, qui est sensiblement plus court que le deuxième, et par le bord latéral antérieur du pronotum légèrement arqué en dehors, tandis qu'il est arqué en dedans chez la *P. prasina*. M. Puton attache une importance décisive à ce dernier caractère.

Pentatoma. Olivier.

1. *JUNIPERINA. Lin.* — Bar-sur-Seine, Fouchères, Estissac. Mai, octobre; sur les genévriers. A.C.

2. *PINICOLA. M. R.* — Luyères, Rigny-la-Nonneuse, Macey, Estissac, Villacerf; en battant les pins. Mars, mai, octobre. A R. J'en ai pris un exemplaire sur un genévrier, dans les bois de pins, au-dessus de Luyères; cette espèce hiverne. J'en ai trouvé un exemplaire dans la mousse, au pied d'un genévrier, dans un bois de pins, près de Luyères, le 28 janvier, et un autre à Estissac, le 17 février.

Piezodorus. Fieber.

1. *INCARNATUS. Germ.* — Bar-sur-Seine, Montgueux, Estissac, etc.; en battant les pins et aussi d'autres arbres. C.

Var. *ALLIACEUS*. *Germ.* — Fouchères; dans une lande de bruyères et de *Genista anglica*; Montgueux, sur des ajoncs; plaine de Foolz; Saint-Benoît-sur-Vanne. Avril, juin. A C.

Rhaphigaster. Lap.

1. *GRISEA*. *Fabr.* — Partout, sur les murs et dans les maisons contre les carreaux des fenêtres, sur les pins et autres arbres. Été, automne. Cet insecte court sur les fruits et leur communique son odeur désagréable. Il varie beaucoup de dessin et de coloration. J'en possède des exemplaires entièrement d'un gris sombre, et d'autres agréablement marbrés de jaune et de gris. CC.

Tropicoris. Hahn.

1. *RUFIPES*. *Lin.* — Saint-Benoît-sur-Vanne, Lusigny, Montceaux, Bar-sur-Seine, Bucey, etc. En battant les chênes sur la lisière des bois. Juin, juillet, août. C.

Eurydema. Lap.

1. *ORNATUM*. *Lin.* — Sur les choux et autres crucifères; jardin du Petit Séminaire; sur les murs, à Saint-Martin; Fontvanne, en fauchant sur *Isatis tinctoria*. CC. Tout l'été.

Var. *PECTORALIS*. *Fieber.* — Troyes. Juillet. RR.

2. *FESTIVUM*. *Lin.* — Montceaux, août. Lusigny, au bord de l'étang de Monmarché, octobre. RR. Sur *Sinapis cheiranthus* (Reiber).

Var. *PICTUM*. *H. S.* — Insecte surtout méridional. Petit marais près de la Chapelle-Saint-Luc, octobre; Estissac, en fauchant, juillet, août; bois de pins en face de la gare de Messon, en battant les pins, octobre; la Grange-au-Rez, en battant les noisetiers et en fauchant. R.

J'indique cet insecte comme variété de l'espèce précédente, sur l'autorité de M. Puton; mais il me paraît bien distinct par sa taille beaucoup plus grande et son facies très différent.

3. *DECORATUM*. *H. S.* — Troyes, dans un jardin; St-Benoît-sur-Vanne, en battant les chênes, octobre; Estissac, février, avril, sous la mousse; Villacerf, août; Villechétif, dans les détritiques de l'inondation; marais de Pars, août; Bar-sur-Seine, mars; Macey, février; Rigny-la-Nonneuse, mai. A R.

Var. *PUTONIA*. — Diffère notablement du type par sa poitrine et son ventre rouges, celui-ci sans taches noires, sauf sur les stigmates; ses pattes ont les cuisses, sauf l'extrémité, et ordinairement le milieu des tibias, rouges; la tête présente, devant les yeux, une grande tache rouge qui se relie à la bordure de même couleur des joues, qui est bien plus large que dans le type.

M. Puton, à qui j'ai soumis cet insecte, le considère comme une variété inédite; je suis heureux de la lui dédier. Cette variété est plus commune que le type à Somsois. J'en ai pris aussi un exemplaire à Montgueux, en juin.

4. *OLERACEUM*. *Lin.* — Sur les fleurs de navette, de colza et d'autres crucifères, tout l'été; l'hiver, sous la mousse. Partout. C.C. Les exemplaires à taches rouges sur les élytres sont moins communs que ceux à taches blanches.

Picromerus. *Am. Serv.*

1. *BIDENS*. *Lin.* — En battant les arbres et en fauchant, Lusigny, octobre; sur les orties (Dubois). A R.

Arma. *Hahn.*

1. *CUSTOS*. *Fabr.* — Sur les murs, sous les feuilles sèches, Le Labourat; jardin du Petit Séminaire, Saint-André, Estissac; bois entre Macey et Fontvanne. Avril, mai, août, octobre, novembre. A R. Sur l'aulne surtout (Puton).

Podisus. *H. S.*

1. *LURIDUS*. *Fabr.* — Bois entre Macey et Fontvanne, mai; Montceaux, août; Somsois, avril, septembre. En battant les arbres et sous la mousse. R. Sur les arbres verts (Puton).

Asopus. *Burm.*

1. *PUNCTATUS*. *Lin.* — Lusigny, bois près de la gare, dans la mousse humide, au bord d'un fossé, avril; Estissac, en battant des fagots de chêne, novembre, décembre. R R. Sur le saule marceau. (Lethierry).

Zicrona. *Am. Serv.*

1. *COERULEA*. *L.* — Arcis-sur-Aube, Villechétif, Saint-Martin-la-Fosse, Villemaur, Romilly, Bar-sur-Seine, etc. Sous les feuilles sèches, sous la mousse. Janvier, février, mars, juin. C.C.

Acanthosoma. Curt.

1. HÆMORRHOIDALE. *Lin.* — Saint-Benoît-sur-Seine, Villemaur, mai; Estissac; jardin du Petit Séminaire, octobre; Somsois. RR. Sur *Prunus padus* (Bellevoye). Sur le tremble (*Populus*).

2. DENTATUM. *De G.* — Jardin du Petit Séminaire, sous la mousse; bois de Pont-sur-Seine, avril; Estissac, mars; Fouchy, octobre; Somsois, sur *Lonicera xylosteon!* avril. AR. Sur les arbres verts (Puton). Sur le saule marceau (Lethierry, Dubois).

Elasmostethus. Fieber.

1. FERRUGATUS. *Fabr.* — Estissac, en battant des arbres en lisière, juillet; bois entre Fontvanne et Bucey, juin; Somsois, parc du château, sur de vieilles aubépines, près de groseilliers sur lesquels, paraît-il, vit cet insecte. RR.

2. INTERSTINCTUS. *Lin.* — Gravières des Marots, en fauchant, juillet; Saint-Martin, sur un mur, novembre; Villechétif, sous les feuilles, janvier; Villemaur, en battant les arbres, mai; Estissac, sur les genévriers. Avril, août. AR. Aussi sur le bouleau (*Robineau-Desvoidy, Cat. Populus*).

Cyphostethus. Fieber.

1. TRISTRIATUS. *Fabr.* — Droupt-Saint-Basle, Montchaud, Fouchères, Estissac, Somsois, etc.; sur les genévriers, pendant presque toute l'année. CC. Aussi sur le *Sarothamnus scoparius* (*Populus*).

CORÉIDES.

Phyllomorpha. Lap.

1. LACINIATA. *Will.* — Je possède dans ma collection un exemplaire de ce curieux insecte que je crois bien avoir pris dans l'Aube, il y a longtemps déjà. Du reste, cette espèce n'est pas exclusivement méridionale, car je l'ai reçue de Châteauroux et je l'ai prise moi-même à Bourgneuf (Loire-Inférieure). Elle peut aussi bien se trouver dans l'Aube que dans l'Indre.

Enoplops. Am. Serv.

1. SCAPHA. *Fabr.* — Bar-sur-Seine, côte de l'Horloge (Carte-reau); Saint-Martin, sur un mur, novembre; Petit Séminaire, sous un tas d'herbes coupées; Lusigny, mai. R R.

Syromastes. Latr.

1. MARGINATUS. *Lin.* — L'hiver, sous la mousse et les feuilles sèches; l'été, sur les arbres et les plantes les plus diverses. Partout. C C. Je le trouve tous les ans en nombre, souvent accouplé, sur les feuilles et les fleurs de la rhubarbe, en mai, dans le jardin du presbytère d'Estissac. La plante qu'il préfère serait, d'après M. Lelièvre, le *Rumex Frisii*.

Verlusia. Spin.

1. RHOMBEA. *Lin.* — Lusigny, Montgueux, La Chapelle-Saint-Luc, Saint-Martin-la-Fosse, Villemaur, Saint-Benoît-sur-Vanne, Bucey-en-Othe, etc. L'hiver, sous les feuilles sèches, les détritiques au pied des pins, la mousse; l'été, en battant les arbres et en fauchant. A C.

Gonocerus. Latr.

1. JUNIPERI. *H. S.* — Luyères, Bar-sur-Seine, Fouchères, Estissac; sur les genévriers. Mars, mai, octobre. C.
2. VENATOR. *Fabr.* — Droupt-Saint-Basle, Montiéramey, Fontvanne, Fouchères, Bar-sur-Seine; en battant les arbres. Mai, juin, juillet, septembre. Saint-Benoît-sur-Vanne. Juin. R. Vit sur *Rhamnus frangula* (Robineau-Desvoidy, Cat. Populus).

Pseudophlœus. Burm.

1. WALTHI. *H. S.* — Le Labourat, La Royale, Montgueux, Montaigu, Fontvannes, Droupt-Saint-Basle, Montchaud, etc; sous la mousse et les feuilles sèches, sous les touffes d'herbes qui bordent les fossés; toute l'année. C C.

Je suis étonné de n'avoir pas encore trouvé dans l'Aube le *P. Fallenii*.

Bathysolen. Fieber.

1. NUBILUS. *Fallen.* — Saint-Benoît-sur-Vanne, côte de la Brosse, route de Saint-Parres, bois de pins en face de la gare de Messon, Bucey-en-Othe; sous la mousse des bois de pins, surtout au pied des genévriers. Janvier, avril, mai, novembre. R.

Nemocoris. Sahlb.

1. **FALLENII. Sahlb.** — Troyes, mur de la Gendarmerie (Laverdet), avril; bois entre Macey et Fontvanne, sous la mousse d'un tronc de chêne, février. R R.

Ceraleptus. Costa.

1. **LIVIDUS. Stein.** — Lusigny, allée herbue dans le bois près de la gare, en fauchant; juin. A R.

2. **GRACILICORNIS. H. S.** — Bar-sur-Seine, côte de Notre-Dame, en fauchant dans une clairière remplie de *Galeobdolon luteum*, mai; Macey, Lusigny, juin. R R.

Coreus. Fabr.

1. **DENTICULATUS. Scop.** — Lusigny, Bar-sur-Seine, Saint-Benoît-sur-Vanne, bois de Thouan, près de Gyé, etc. En fauchant sur les plantes; quelquefois sous la mousse. Partout. C C.

Alydus. Fabr.

1. **CALCARATUS. Lin.** — Neuville-sur-Seine, Colombé-le-Sec, Vulaines, Loches, Bar-sur-Seine, Villacerf, canal près de Bréviandes, etc.; juin, juillet, septembre; en fauchant dans les endroits arides. C. Sur les genêts, l'hellébore fétide (Puton).

Stenocephalus. Latr.

1. **AGILIS. Scop.** — Montaigu, Montgueux, Fouchy, Bar-sur-Seine, Macey, etc. L'été, sur les euphorbes, l'hiver, sous la mousse, les feuilles, les tas d'herbe. Je l'ai pris en mars, en battant des pins. C C.

2. **MEDIUS. Mls. R.** — Bar-sur-Seine, forêt de Bois-Bréard, en battant des fagots de chêne, novembre; juin, en fauchant. R R.

3. **NEGLECTUS. H. S.** — Fouchy, Lusigny, Bar-sur-Seine. Mai, juin; sur les euphorbes, avec *S. agilis*; Saint-Martin, sur un mur, novembre. A G.

Therapha. Am.

1. **HYOSCIAMI. Lin.** — Droupt-Saint-Basle, sur un genévrier, mars; Bar-sur-Seine, sur un pin, octobre; Romilly, sous la mousse au pied des genévriers, janvier; Bar-sur-Seine, dans des fagots de

chêne, novembre; Lusigny, Estissac, octobre, etc. L'été en fauchant sur les plantes; sur le millepertuis (Dubois). A C.

Cet insecte, malgré son nom qui indiquerait un habitat exclusif, se trouve sur les plantes les plus diverses, même sur la *Jusquiame*. J'ai eu la satisfaction d'en prendre un exemplaire sur cette plante dans une rue de Saint-Benoît-sur-Vanne, en juin.

Corizus. Fallen.

1. *CRASSICORNIS. Lin.* — Partout, l'été et l'automne. C C. Sur *Cirsium palustre* (Lethierry).

Var. *ABUTILON. Rossi.* — Plaine de Foolz, en fauchant sur les bruyères, juillet; Bar-sur-Seine, Lusigny, etc. A C.

2. *MACULATUS. Fieb.* — Villechétif, Fouchères, plaine de Foolz, en fauchant; Estissac, dans les prés marécageux, au bord de la Vanne. Mai, juin. R.

3. *CAPITATUS. Fabr.* — Lusigny, Neuville-sur-Seine, Villechétif, l'été; Estissac, octobre; Macey, juillet; bois entre Fontvanne et Bucey, juin. A R. Sur le millepertuis (Lethierry).

4. *DISTINCTUS. Signor.* — Rosnay, sous des branches de pins coupées, avril; Estissac, dans des fagots de chêne, novembre; Somois, en battant les pins. R R.

5. *PARUMPUNCTATUS. Schill.* — Montgueux, Villechétif, Lusigny, etc. Mars, mai, juin. C C. Sur un *Galium* à fleurs jaunes (Lethierry).

6. *RUFUS. Schill.* — Avec le précédent, dont il n'est peut-être qu'une variété. C.

7. *TIGRINUS. Schill.* — Bois de Macey, sous la mousse d'un chêne, avril; Villacerf, sous des écorces de pins et en battant des fagots de pins, novembre, janvier. R. Cet insecte se prend aussi en battant les gros genévriers.

Myrmus. Hahn.

1. *MIRIFORMIS. Fall.* — Fouchères, Estissac, Lusigny, le Prédillon, etc. Partout, tout l'été; en fauchant sur les plantes. C C. Les exemplaires macroptères sont un peu moins communs que les brachyptères. Sur les genêts (Puton). Sur les *Centaurea*, les *Senecio* (Lethierry).

BÉRYTIDES.

Neides. Latr.

1. *TIPULARIUS. Lin.* — Montchaud, Petit-Séminaire, Le Labourat, Rosnay, bois de Bourguignons, Saint-Martin-la-Fosse, bois entre Macey et Fontvanne, Estissac; sous la mousse et les herbes et en battant les vieux fagots; janvier, mars, septembre, novembre, décembre. A C. Sur les *Erodium* et *Verbascum* (Puton). Sur les pins (Dubois).

Le *N. parallelus* de Fieber est la forme brachyptère de cette espèce. Je n'ai pas encore trouvé cette forme dans l'Aube.

Berytus. Fabr.

1. *HIRTICORNIS. Brul.* — Bar-sur-Seine, forêt de Bois-Bréard, en battant des fagots de chêne, novembre. R R. Cette espèce est très commune dans les environs d'Orléans; je l'ai prise aussi à Pornic (Loire-Inférieure). Je ne l'ai trouvée qu'une seule fois jusqu'ici dans l'Aube. Elle est très facile à reconnaître aux longs poils dont sont hérissées ses antennes et ses pattes.

2. *CLAVIPES. Fabr.* — Fouchy, Lusigny, bois près de la gare, Fouchères, juin, juillet. A R.

3. *MINOR. H. S.* — Loches, septembre; Assencières, etc. R.

4. *MONTIVAGUS. Fieber.* — Montchaud, La Royale, Montgneux, Lusigny, Estissac, Fontvanne, etc.; sous la mousse et les feuilles de pins tombées; toute l'année. C.

5. *SIGNORETI. Fieber.* — Bar-sur-Seine, friche de Vauvrères, sous les herbes et entre les petites pierres, mai; friche près de Fontvanne, sous les feuilles tombées au pied d'un jeune pin, décembre; Villacerf, mars; Estissac, novembre. R.

Metacanthus. Costa.

1. *ELEGANS. Curt.* — Bois en face de Bourguignons, sous la mousse; Montchaud, Le Prédillon, Estissac, en battant des fagots de chêne; Fontvanne, Villechétif; février, mai, octobre, novembre. A C. Sur les *Ononis* (Puton, Dubois).

LYGÆIDES.

Lygæus. Fabr.

1. FAMILIARIS. *Fabr.* — Rosnay, côte de la Garenne, septembre, octobre; très abondant sur *Asclepias vincetoxicum*. Bar-sur-Aube, côte de Sainte-Germaine, un exemplaire mort sous l'écorce d'un pin.

2. EQUESTRIS. *Lin.* — Bois de Pont, avril; Bar-sur-Seine, octobre; portail de l'église de Chacenay, septembre; Montchaud, en battant les pins. J'ai trouvé cette espèce en grand nombre sous une écorce de chêne à Bar-sur-Seine, en janvier, et une autre fois en novembre, sous l'écorce d'un vieux noyer. Ces insectes étaient réunis par plaques sous l'écorce. C.

3. SAXATILIS. *Scop.* — L'hiver, au pied des arbres, sous les feuilles, sous les écorces; l'été sur les chardons et autres plantes. C C.

4. APUANUS. *Rossi.* — Bouilly; barrière devant le château des Cours, à Saint-Julien, avril; portail de l'église de Chacenay, septembre; Bar-sur-Seine, en compagnie d'*Aphanus pedestris*, sous une écorce de noyer, en novembre, janvier. A C.

5. PUNCTATOGUTTATUS. *Fabr.* — Bar-sur-Seine; Loches, sous un tas de chiendent, septembre; Neuville-sur-Seine, sous une pierre, près de la statue de Notre-Dame-des-Vignes. J'ai trouvé, en janvier, un exemplaire de cette espèce qui s'était caché, pour passer l'hiver, dans une coquille de *Cyclostoma sulcatum*. R.

Arocatus. Spin.

1. MELANOCEPHALUS. *Fabr.* — Jardin du Grand-Séminaire, juin. R R. Sur les vieux tilleuls (Puton).

2. ROESSELI. *Schum.* — Pont-Hubert, route de Saint-Parres, Argentolle, sous l'écorce des platanes, janvier, février; Chenegy, sous la mousse d'un tronc de chêne, janvier; croix des Mottes, route de Sens, sous une écorce d'épicéa, décembre. R R.

Nysius. Dall.

1. **SENECIONIS. Schill.** — Somsois, août. Cette espèce, très commune dans beaucoup de départements voisins, doit aussi se trouver dans l'Aube.

2. **PUNCTIPENNIS. H. S.** — Dans le lit à sec du canal au-dessus de Bréviandes, sur *Origanum vulgare*, août; Macey, Montgueux, juillet; Bucey, août. Abondant, en certaines années, sur *Hypericum perforatum*, à Somsois, R.

Cymus. Hahn.

1. **GLANDICOLOR. Hahn.** — Villechétif, Foicy, Lusigny, Barsur-Seine, etc. En fauchant sur les carex, surtout sur *Carex glauca*; tout l'été. Romilly, sous la mousse au pied des genévriers, janvier. C.C.

2. **OBLIQUUS. Horv.** — Vendevre, forêt du Temple, sur *Schœnus mariscus*, août. C.C. Cette espèce a été séparée récemment de la précédente par M. le docteur Horvath.

3. **MELANOCEPHALUS. Fieber.** — Lusigny et beaucoup d'autres localités, sur les plantes des endroits marécageux; tout l'été. C.

4. **CLAVICULUS. Fall.** — Romilly, Rosnay, Assencières, Saint-Benoît-sur-Vanne, Montgueux, Fouchères, Estissac, etc.; sous la mousse. Janvier, mars, avril, septembre. A.R. Sur *Echium vulgare* (Dubois).

Ischnorhynchus. Fieber.

1. **RESEDEÆ. Panz.** — Jardin du Petit Séminaire, au printemps, sous la mousse; plus tard, sur les arbustes; Estissac, sur des bouleaux, mars; Villechétif, avril; Fouchères, juin. Aussi sur les pins (Lethierry).

2. **GEMINATUS. Fieber.** — Villechétif. (?) R.R. Sur les bruyères (Poulain, Cat. Populus).

Ischnodemus. Fieber.

1. **SABULETI. Fall.** — Lusigny, sous des tas d'herbes, au bord d'un étang; extrêmement abondant; octobre. Villechétif, sous des *Scirpus* coupés, un exemplaire macroptère, mai; le Pont-Hubert, en fauchant, l'été. Les exemplaires barachyptères sont beaucoup plus abondants que les macroptères; la proportion est à peu près de quatre ou cinq pour cent.

Geocoris. Fall.

1. GRYLLOIDES. *Lin.* — La collection du Musée possède plusieurs exemplaires de cette espèce pris par Jules Ray, peut-être à La Chapelle-Saint-Luc. (?) J'en ai pris deux exemplaires à Somsois, sous de larges touffes de *Thymus serpyllum*, dans des endroits arides, en août. Il est probable que cet insecte se retrouvera dans l'Aube, dans des localités analogues. RR.

Chilacis. Fieber.

1. TYPHÆ. *Perris.* — Cette espèce, considérée comme très rare, se trouve en grande abondance dans la bourre desséchée des massettes de *Typha latifolia*, et *T. angustifolia*. Je l'ai prise par centaines l'été, dans un petit marais près de la gare de Lusigny; je l'ai trouvée aussi dans le canal, entre Bréviandes et les Maisons-Blanches, en août, et dans les marais de Saint-Gond, près de Reuves (Marne). Ce petit insecte est un des rares *lygæides* qui possède à un haut degré l'odeur de punaise. D'après M. Lethierry, il se trouverait aussi sur les roseaux.

Heterogaster. Schill.

1. AFFINIS. *H. S.* — Montaigu, Droupt-Saint-Basle, Romilly; Bar-sur-Seine, écorce de noyer, janvier; Argentolle, écorce de platane, février; Saint-Benoît-sur-Vanne, bois de Macey; Rigny-la-Nonneuse, dans les débris d'une ruche; Villacerf, écorce de pins; Estissac, Bar-sur-Seine, Bar-sur-Aube, jardin du Petit-Séminaire, etc. Janvier, février, mars, octobre, décembre. Sur l'ortie (Poulain, Cat. Populus).

Cet insecte, qui est rare dans certaines parties de la France, est très abondant dans toute la vallée de la Vanne, sous la mousse des troncs de chênes, en compagnie d'un coléoptère, *Dermestes undulatus*. Il est rare dans le reste du département.

2. ARTEMISIÆ. *Schill.* — Montaigu, Rosnay, Montchaud, Droupt-Saint-Basle, Macey, sous la mousse au pied des arbres; Montgueux, au-dessus de la carrière de craie, sous les touffes de *Thymus serpyllum*, août; Bar-sur-Seine, décembre. Cet insecte se prend souvent aussi en battant les fagots de branches de pins, l'hiver et au printemps. C. Sur les bruyères et les genévriers (Puton).

3. URTICÆ. *Fabr.* — Fouchy, Petit-Séminaire, Estissac, Lusi-

gny, murs de Saint-Martin, etc. Mai, juin, octobre; quelquefois l'hiver sous la mousse. Cette espèce est parfois très abondante sur les orties. C.

Platyplax. Fieber.

1. *SALVIÆ. Schill.* — Bar-sur-Seine, friches de Vauvrères et prairies près du bois de Semont; Venduvre, parc du château; juin, en fauchant sur *Salvia pratensis*; cet insecte hiverne; je l'ai pris à Bar-sur-Seine, côte de Notre-Dame, sous la mousse d'un chêne, en janvier. Abondant là où il se trouve, mais très localisé.

Microplax. Fieber.

1. *ALBOFASCIATA. Costa.* — Estissac, côte de Beauregard, sous l'écorce des pins. Décembre, janvier. R R.

Cette espèce est très abondante à Pornic (Loire-Inférieure), sur les gnaphales défloris.

Macroplax. Fieber.

1. *PREYSSLERI. Fieber.* — Plaine de Foolz, en fauchant sur les bruyères, juillet; Estissac, talus herbu, septembre; Fontvanne, juin, octobre; Bucey-en-Othe, sous la mousse, au pied d'un genévrier, novembre; Bar-sur-Seine, côte à droite du chemin de fer, octobre, janvier. Abondant dans cette dernière localité; rare ailleurs.

Plociomerus. Say.

1. *FRACTICOLLIS. Schill.* — Villechétif; très abondant, au printemps, dans les détritux de l'inondation, l'été, sur les carex, en automne, sous les tas d'herbes coupées. J'en ai trouvé un exemplaire en février, dans un tronc de peuplier décomposé; Saint-Martin-la-Fosse; Romilly, sous la mousse, janvier; bois de Chappes, novembre; Lusigny, au bord de l'étang de Monmarché, octobre; Estissac, prairies au bord de la Vanne, mai. CC.

Cette espèce, qui habite ordinairement les marais, se trouve aussi, mais plus rarement et par exemplaires isolés, dans des endroits très secs et loin de l'eau.

2. *LURIDUS. Hahn.* — Saint-Benoît-sur-Vanne, près de la ferme d'Armentières, sous les roseaux amassés par l'eau, avril; Estissac, dans les prairies de la vallée de la Vanne, mai, juin. R.

Rhyparochromus. Curt.

1. ANTENNATUS. *Schill.* — Le Labourat, dans la mousse, au pied d'un peuplier, avril; Lusigny, bois près de la gare, dans la mousse humide, au bord d'un fossé, mars, avril. R.

2. PRÆTEXTATUS. *H. S.* — Estissac, sous la mousse, septembre. RR. Cet insecte est commun sur les côtes de Bretagne et de Normandie, mais je n'en ai pris dans l'Aube qu'un seul exemplaire.

3. DILATATUS. *H. S.* — Estissac, sous la mousse et au pied d'un bouleau, mars; Somsois, sous la mousse au pied des pins. RR.

4. CHIRAGRA. *Fabr.* — Montgueux, Montchaud, Droupt-Saint-Basle, Saint-Martin-la-Fosse, Macey, etc. Sous la mousse, surtout dans les bois de pins. CC.

Var. SABULIGOLA. *Thoms.* — Avec le type, dont il diffère bien peu. C.

Tropistethus. Fieber.

1. HOLOSERICUS. *Schltz.* — Petit Séminaire, Montgueux, Montchaud, Macey, Bar-sur-Seine, Saint-Benoît-sur-Vanne, bois de Bourguignons, etc. Sous la mousse, toute l'année. CC.

Ischnocoris. Fieber.

1. HEMIPTERUS. *Schill.* — Saint-Benoît-sur-Vanne, Saint-Martin-la-Fosse, Macey, Montchaud, Estissac, Bar-sur-Seine; sous la mousse. Janvier, février, mars, avril, octobre. AR. Se trouve à la racine des bruyères (Lethierry).

2. ANGUSTULUS. *Bohm.* — Espèce confondue avec la précédente; diffère surtout par le deuxième article des antennes, noir à la base et jaune seulement au sommet, et par les élytres plus longues. Montchaud, février; Bar-sur-Seine, octobre. RR. Un des exemplaires que je possède a été vu par M. Puton.

Macrodema. Fieber.

1. MICROPTERUM. *Curt.* — Fouchères, dans une lande sablonneuse, sous la mousse, au pied des bruyères, février; et sous un tas de bruyères coupées, juin. R.

Plinthisus. Fieber.

1. BREVIPENNIS. *Latr.* — Montchaud, bois de Bourguignons, Macey, Estissac, Droupt-Saint-Basle, Assencières, Bar-sur-Seine, etc. Sous la mousse, toute l'année. CC.

Var. *BIDENTULUS*. *H. S.* — Forme macroptère du *brevipennis*. Saint-Martin-la-Fosse, bois de pins, janvier; bois de Bourguignons, sous la mousse, février; Villemaur, mars; Rosnay, avril; Bar-sur-Seine, côte de Vauvrères; bois de Macey, sous la mousse des troncs de chênes, en hiver et en automne. Moins commun que la forme brachyptère, sans cependant être rare.

Lasiosomus. *Fieber*.

1. *ENERVIS*. *H. S.* — Lusigny, juin, juillet; garenne de Juilly, sous des feuilles de noisetier; Estissac, dans des fagots de chêne, novembre; Bar-sur-Seine. R. Sur les fougères (Lethierry).

Acompus. *Fieber*.

1. *RUFIPES*. *Wolff*. — Villechétif, l'hiver, sous les détritiques et les feuilles sèches, l'été, sur *Valeriana officinalis*; Bar-sur-Seine, juin, sur la même plante. Cet insecte vit aussi sur *Valeriana dioica*. Je l'ai trouvé accouplé en mai, sur cette plante, à Maizières-la-Grande-Paroisse, dans les prés au bord de la Seine. C C.

Stygnus. *Fieber*.

1. *RUSTICUS*. *Fall*. — Les Noës, sous la mousse; Villechétif, sous les feuilles sèches, dans la garenne, décembre; Foicy, avril. R.

2. *PEDESTRIS*. *Fall*. — Montgueux, mai; Macey, novembre, etc.; sous la mousse et les feuilles, accouplement en novembre! C.

3. *ARENARIUS*. *Hahn*. — Avenue du château de Rosières, au pied des épicéas, octobre; Montchaud; Estissac, janvier. Plus rare que le précédent.

Lasiocoris. *Fieber*.

1. *ANOMALUS*. *Kol*. — Loches, sous une pierre, sur la côte qui conduit au Point-de-Vue, septembre; garenne de Juilly, en battant des fagots de chêne, décembre; Bar-sur-Seine, dans des fagots de pins, près du bois de Forêt-Bréard, décembre, et dans la friche de Vauvrères, entre les petites pierres, juin. R R.

Ce bel et rare insecte a le faciès de certains *Aphanus*.

Peritrechus. *Fieber*.

1. *GENICULATUS*. *Hahn*. — Fouchy, Pont-sur-Seine, juin; Fouchères, accouplement en avril; Villechétif, octobre; Juilly, décembre; Rigny-la-Nonneuse, mai. R. Sur *Cytisus laburnum* (Dubois).

2. GRACHILICORNIS. *Put.* — Petit-Séminaire, Montgueux, Saint-Benoît-sur-Vanne, Saint-Martin-la-Fosse, Juilly, bois de Bourguignons, Villemaur, Rigny-la-Nonneuse, dans une vieille ruche, Lusigny, etc. Janvier, février, mars, avril, mai, octobre, etc.

Cet insecte est très commun toute l'année et partout; sous la mousse, les feuilles sèches, dans les vieux fagots.

3. NUBILUS. *Foll.* — Bar-sur-Seine, octobre; Somsois, avril. R.

4. LUNIGER. *Schill.* — Sous les détritits, la mousse, les feuilles, dans les fagots, partout et toute l'année. C. C.

Microtoma. Lap.

1. ATRATA. *Goeze. CARBONARIA. Rossi.* — Sous la mousse, dans un petit bois de pins, sur la côte de Montgueux. Printemps. R. R.

D'après M. Puton, cet insecte se trouverait sur les *Echium*. Il est extrêmement rare dans l'Aube; je n'en ai pris qu'un seul exemplaire.

Trapezonotus. Fieber.

1. ANORUS. *Flor.* — Espèce d'Allemagne et de Russie qui n'avait pas encore été signalée en France. Je le prends assez facilement pendant l'automne et l'hiver, sous la mousse des troncs de chêne. Bois de Macey, février, novembre; Saint-Benoît-sur-Vanne, novembre; Chenegy, janvier; bois entre Messon et Bucey, novembre, décembre. Un exemplaire dans cette dernière localité, en octobre, sous des feuilles de noisetier, à terre.

Pendant longtemps j'ai cru cet insecte localisé dans la vallée de la Vanne et les petites vallées parallèles. J'ai été bien surpris de le prendre à deux époques différentes, en avril et en octobre, dans le marais de Villechétif, sous des tas d'herbes et de roseaux. Il est étrange que cette espèce ne se prenne nulle part en France que dans l'Aube, au moins à ma connaissance.

Ce *Trapezonotus* se distingue facilement de ses congénères par sa couleur plus sombre, sa forme plus parallèle, ses antennes et ses pattes entièrement noires, sa membrane très écourtée et surtout par ses fémurs antérieurs sans épines.

2. AGRESTIS. *Fall.* — Environs de Troyes, mai; Estissac, mousse des troncs de chênes, mars. R.

3. DISPAR. *Stal.* — Bouilly, bois des Brosses; bois de Macey, garenne de Juilly, Villemaur, Saint-Benoît-sur-Vanne, Estissac,

Bar-sur-Seine, bois de Forêt-Bréard, Lusigny, etc. Mars, avril, octobre, novembre, décembre. Sous la mousse des troncs de chêne; CC., surtout dans la vallée de la Vanne.

4. ULLRICHII. *Fieber.* — Fouchy, juin; Lusigny, bois près de la gare, dans la mousse humide, au bord d'un fossé. RR.

Calyptonotus. Dgl.

1. ROLANDI. *Lin.* — Bouilly, bois des Brosses; Droupt-Saint-Basle, Macey, Saint-Parres, Bar-sur-Seine, Villechétif, Estissac, Le Labourat, La Royale, etc. Sous les détritux et les feuilles au pied des arbres, sous la mousse des troncs de chênes, sous les écorces de saules; mars, avril, octobre, décembre. AC.

Aphanus. Lap.

1. ADSPERSUS. *Muls. R.* — Sous la mousse, au pied d'un pin, à Malminoux, près de Saint-Martin-la-Fosse, septembre. Estissac, sous la mousse, avril. RR.

2. LYNCEUS. *Fabr.* — Rive droite du canal en aval de Troyes, sous les feuilles sèches, mars; Romilly, Saint-Benoît-sur-Vanne, sous la mousse, au pied des genévriers, janvier, octobre; Saint-Martin-la-Fosse, au pied des pins, septembre; Petit Séminaire, sous la mousse, avril, décembre; Villemaur, mars, abondant; Montgueux, Estissac, Lusigny, Bar-sur-Seine, mars, avril, etc. AR.

3. QUADRATUS. *Fabr.* — Sous la mousse, bois de pins près de Saint-Martin-la-Fosse, septembre, janvier; Bar-sur-Seine, octobre, novembre. AR.

4. PEDESTRIS. *Panz.* — Sous la mousse, au pied des chênes et des pins. Saint-Martin-la-Fosse, janvier, septembre; forêt d'Aumont, mars; Leches, octobre; bois de Chappes, sous une écorce de bouleau, novembre; garenne de Juilly, février, décembre; bois de Bourguignons, janvier; Bar-sur-Aube, bois de pins sur la côte de Sainte-Germaine, février; Bar-sur-Seine, bois de Forêt-Bréard, novembre; bois entre Macey et Fontvanne, février, mars. Abondant parfois. AC.

5. VULGARIS. *Schill.* — Brienne-la-Vieille, avril; jardin du Petit Séminaire, dans une vieille ruche.

Malgré le nom qu'il porte, cet insecte est loin d'être commun dans l'Aube.

6. *PINI. Lin.* — Villechétif, sous les tas de roseaux; Fouchy, le Labourat, Montgueux, Macey, etc. Mars avril, octobre, novembre; sous la mousse et les feuilles. C.C. Sur *Echium vulgare* et *Hypericum perforatum* (Dubois).

7. *PHOENICEUS. Rossi.* — Droupt-Saint-Basle, avril; Neuville-sur-Seine, sous des pierres, près de la statue de Notre-Dame-des-Vignes, octobre; Foicy, sous une touffe de *Verbascum*, mars; Bar-sur-Seine, sous des pierres, janvier; Estissac, sous la mousse, mars, novembre; Somsois, en battant des fagots de pins, quelquefois assez abondant. R.

Beosus. Am. Serv.

1. *LUSCUS. Fabr.* — Montgueux, Montaigu, le Labourat; bois de pins, près de la Grange-au-Rez, en battant une vieille ruche; Saint-Benoît-sur-Vanne; Villacerf, dans des fagots de pins, abondant; Bar-sur-Seine, Villemaur, garenne de Juilly, Rigny-la-Nonneuse, Romilly, Lusigny, etc. Sous la mousse et les feuilles au pied des arbres; toute l'année. C.C.

Emblethis. Fieber.

1. *VERBASCI. Fabr.* — Côte de Montgueux, sous la mousse, dans un bois de pins; Droupt-Saint-Basle; bois de Bourguignons, février; Estissac, octobre, etc. Sous la mousse et les herbes au pied des arbres. A.R.

Eremocoris. Fieber.

1. *PLEBEJUS. Fall.* — Montgueux, Villechétif, Plaines, Saint-Martin-la-Fosse, Estissac, Bar-sur-Seine, Saint-Benoît-sur-Vanne, Villacerf. Janvier, février, mars, avril, octobre. Sous la mousse, surtout dans les bois de pins. A.R.

2. *PODAGRICUS. Fabr. Var. ALPINUS. Garb.* — Saint-Benoît-sur-Vanne, côte de la Brosse, sous la mousse épaisse, au pied des genévriers, avril, octobre; Estissac, lisière du bois de Charmes, sous la mousse, avril, octobre; bois de Chialot, en battant un fagot de chêne, novembre. R. Localisé jusqu'ici dans la vallée de la Vanne.

3. *ERRATICUS. Fabr.* — Somsois, sous la mousse, septembre. R.R.

Drymus. Fieber.

1. *PILICORNIS. Mes. R.* — Petit Séminaire, mai; Romilly,

dans la mousse au pied d'un genévrier, janvier; bois de pins près de Luyères, sous la mousse. RR.

2. *SYLVATICUS*. *Fabr.* — Sous la mousse et les feuilles sèches. Partout, toute l'année. CC.

Var. *NIGER*. — Cette variété, qui est entièrement noire, avec le bord extrême des cories roux et une tache blanche ou rousse à la base de la membrane, me paraît assez constante et assez caractérisée pour mériter un nom spécial. Elle se trouve avec le type, mais plus rarement.

3. *BRUNNEUS*. *Sahlb.* — Villechétif, sous des tas d'herbes coupées et sous des feuilles sèches de noisetier, novembre; bois en face de Bourguignons, sous la mousse, octobre; Estissac, avril; Lusigny, sous la mousse humide, au bord d'un fossé, dans le bois près de la gare, mars, avril; Petit Séminaire, avril. AR.

Scolopostethus. *Fieber.*

1. *PICTUS*. *Schill.* — Romilly, dans un fagot, janvier; Villechétif, sous les feuilles, mars; Lusigny, étang de Monmarché, sous des tas d'herbes coupées, octobre. R.

2. *AFFINIS*. *Schill.* — Villechétif, le Labourat, sous la mousse et les feuilles sèches, mars, avril; La Chapelle-Saint-Luc, Estissac, etc., octobre, janvier, février. Abondant dans le jardin du Petit Séminaire, sous la mousse, toute l'année. CC.

3. *PILOSUS*. *Reuter.* — Villechétif, mai, mars; Bar-sur-Seine, bois de Forêt-Bréard, sous la mousse, novembre. RR.

Notochilus. *Fieber.*

1. *CONTRACTUS*. *H. S.* — Montgueux, Fouchy, Luyères, Saint-Benoît-sur-Vanne, Macey, Estissac, etc. Sous la mousse, surtout dans les bois de pins; toute l'année. CC.

2. *OBSCURIOR*. *Rey.* — Petit-Séminaire, mars; Rosières, octobre; bois de pins entre Macey et Fontvanne, novembre; Saint-Benoît-sur-Vanne, mai; Montchaud, mars; Villechétif, octobre. RR.

D'après M. Cl. Rey, qui a décrit cette espèce dans la *Revue d'Entomologie*, « cet insecte, qu'on prendait d'abord pour une variété de *N. contractus*, en diffère par une taille moindre, par une couleur généralement plus obscure et plus mate, avec la tache basilaire des élytres plus nébuleuse et peu tranchée, la membrane encore plus nébuleuse et l'excorie moins ponctuée, à tache latérale

postérieure presque indistincte et non reliée au rebord lui-même. Le prothorax est un peu plus court, moins rétréci en avant, plus densément et plus rugueusement ponctué, à sillons un peu moins forts. Les antennes paraissent un peu moins longues, etc. »

M. Cl. Rey a revu lui-même deux de mes exemplaires qu'il a trouvés conformes à son type.

Dans les exemplaires que je possède, la tache postérieure des élytres manque complètement. Cette espèce diffère beaucoup, comme aspect général, du *N. contractus*.

Gastrodes. *Westw.*

1. **ABIETIS.** *Lin.* — Bois de Pont, juin; Saint-Benoît-sur-Vanne, avril; Bar-sur-Seine, juin; Saint-Parres, propriété de M. Vignes, sur des épicéas en fleurs, mai; bois de pins en face de la gare de Messon, mars; Estissac, mai; Chaplaines (Marne). R.

Dans cette dernière localité, on a constaté que cet insecte se cache sous les écailles des cônes d'épicéas, et que, quand on met ces derniers au feu, les *Gastrodes* sortent de leur retraite et se répandent en grand nombre dans tout l'appartement.

2. **FERRUGINEUS.** *Lin.* — Croix des Moites, route de Sens, sous les écorces d'épicéas, l'hiver, abondant; Saint-Benoît-sur-Vanne, bois de Macey, Estissac. Mars, mai, juillet. En battant les épicéas et les pins. C.C. J'ai trouvé la larve dans les cônes du pin sylvestre.

Pyrrhocoris. *Fallen.*

1. **APTERUS.** *Lin.* — Au pied des arbres, sur les barrières, sur les murs exposés au soleil. Saint-Benoît-sur-Vanne, très abondant dans le jardin du presbytère; Bar-sur-Aube, sur les gros tilleuls, auprès de la chapelle de Sainte-Germaine; garenne de Villechétif, sous les feuilles sèches, etc. C.C. Printemps, été, et même hiver quand la température se radoucit.

Je n'ai jamais pris dans l'Aube d'exemplaires macroptères.

TINGIDIDES.

Pisma. *Lep. et S.*

1. **CAPITATA.** *Wolff.*

2. **MACULATA.** *Lap.* — Rosnay, Villemaur, Saint-André, bois de Macey, Saint-Martin-la-Fosse, Bar-sur-Seine, etc. Sous la

mousse, surtout dans les bois de pins et en battant les fagots. Toute l'année. C C.

Les insectes de ce genre vivent surtout sur les chenopodiacées (Puton). Sur les vieux lierres (Dubois).

Orthostira. Fieber.

1. CERVINA. *Germ.* — Bois de Fouchy, sous la mousse, au bord d'un fossé; Villechétif, mars; Maizières-la-Grande-Paroisse, mai; marais de Pars, août. R R.

2. PARVULA. *Fall.* — Montchaud, Macey, Villemaur, Bar-sur-Seine, Estissac, Chenegy, etc. Mars, avril, octobre, novembre. Sous la mousse. C.

Derephysia. Spin.

FOLIACEA. *Fall.* — Montceaux, juillet; canal, vers Bréviandes, août; Bar-sur-Seine, juillet; bois de Thouan, près de Neuville-sur-Seine; Villacerf, sous la mousse, au pied des pins, août. R. Quelquefois sur les vieux lierres (Puton).

Galeatus. Curt.

1. MACULATUS. *H. S.* — Bar-sur-Seine, friches de Vauvrères. Juillet. R R. Vit sur *Hieracium pilosella* (Puton).

Tingis. Fabr.

1. PYRI. *Fabr.* — Bar-sur-Seine (Cartereau). Je suis surpris de n'avoir pas encore trouvé moi-même cet insecte qui, dans certains pays, dévaste les poiriers et a reçu le nom de *Tigre*, à cause de ses mouchetures brunes sur fond blanc.

Eurycera. Lap.

1. CLAVICORNIS. *Fourc.* — Bar-sur-Seine, friches de Vauvrères, sous les touffes de *Teucrium chamædrys*, avril, juin, et en fauchant sur cette plante, juillet; carrière entre Fontvanne et Estissac. Cet insecte se loge dans des galles qui résultent de sa piqûre; on en trouve un, quelquefois deux, dans ces déformations de la fleur du *Teucrium chamædrys*. A C.

2. TEUCRII. *Host.* — Villacerf, Chenegy, sur *Teucrium montanum*, août. Cet insecte a les mêmes mœurs que le précédent; il pique la fleur du *Teucrium montanum*, et se loge dans la déforma-

tion qui suit sa piqûre. Il s'y tient ordinairement la tête en bas. Cette espèce est très abondante dans les endroits crayeux et arides entre Somsois et Meixtiercelin (Marne). C.

Monanthia. Lep. et S.

1. *AMPLIATA. Fieber.* — Lusigny, en fauchant sur les plantes aquatiques, dans un petit marais, près du chemin de fer, juin; sous des herbes coupées, près d'un étang, octobre; en fauchant sur le bord d'un autre étang, été. R. Sur les chardons (Lelièvre).

2. *CARDUI. Lin.* — Bar-sur-Seine, bois, près d'Avalleur, sur les chardons, juin; sous la mousse, au pied d'un genévrier, dans un bois de pins à droite du chemin de fer, janvier; Lusigny, sous des herbes coupées, au bord d'un étang, octobre. A R.

3. *AURICULATA. Costa.* — Fontvanne, avril, en battant les pins. R R. Sur *Stachys recta* (Frey-Gessner).

4. *CILIATA. Fieber.* — Bois entre la gare de Messon et celle de Fontvanne, sous la mousse d'un chêne, novembre; Pont-Hubert, sur *Ajuga reptans*, mai; Saint-Benoît-sur-Vanne, juin; Neuville-sur-Vanne, Pont-sur-Seine (J. Ray). R R.

5. *ANGUSTATA. H. S.* — Somsois, septembre. R R.

6. *AJUGARUM. Frey.* — Montgueux, Rosnay, Droupt-Saint-Basle, Montaigu, Estissac, bois de Macey, Bucey-en-Othe, Saint-Benoît-sur-Vanne, Bar-sur-Seine. Hiver, printemps, automne, sous la mousse, surtout dans les bois de pins et en battant les fagots. C., surtout dans la vallée de la Vanne.

Cette espèce vit sur les *Ajuga chamæpitys* et *genevensis* (Frey-Gessner).

6^{bis}. *CAPUCINA. Germ.* — Estissac, côte de Beauregard, au pied des pins, novembre. Vit sur *Thymus serpyllum* (Puton, Populus). R R.

7. *GENICULATA. Fieber.* — Rosnay, septembre; sous la mousse, au pied des épicéas, dans la garenne. M. Populus dit qu'elle habite exclusivement sur les branches des épicéas. Mon observation ne concorde pas avec la sienne.

8. *MACULATA. H. S.* — Bar-sur-Seine, friches de Vauvrères, l'été, en fauchant sur les *Stachys*; au printemps, sous les touffes de ces plantes. R.

9. *ANGUSTICOLLIS. H. S.* — Bois de pins en face de la gare de Messon, sous la mousse, mars. R R. Cet insecte vit sur *Galeopsis*

tetrahit. Je l'ai pris plusieurs années de suite sous les feuilles tombées de cette plante, dans le marais de Chaplaines (Marne); aussi sur *Stachys sylvatica* (Frey-Gessner); sur *Leonurus cardiaca*, *Lappa minor* et *Ballota nigra* (Horvath).

10. *COSTATA*. *Fabr.* — Le Labourat, Lusigny, Fouchères. Mai, juin, juillet, novembre. L'été, en fauchant dans les prés; en automne et en hiver, sous les feuilles sèches. R. Sur les *Chrysanthemum* (Frey-Gessner).

11. *HORVATHI*. *Put.* — Droupt-Saint-Basle, juillet; en fauchant dans des friches, Estissac, sous la mousse, novembre. R R. Vit sur les *Eryngium* (Puton).

12. *DUMETORUM*. *H. S.* — Rosnay, avril; Lusigny, juin, en battant les anémone en fleur. R. Vit sur le prunellier surtout (Puton).

13. *SIMPLEX*. *H. S.* — Villechétif, dans un tronc d'aulne. Mai. R R. Sur *Senecio Jacobææ* (Fieber), et au pied d'*Euphorbia cyparissias* (Frey-Gessner), juin.

14. *WOLFFII*. *Fieber.* — Fouchy; canal, près de Bréviandes, août; grèves de la Seine, à Foicy; Rosnay, avril; route de Saint-Parres, sous une écorce de platane, février. Cet insecte est extrêmement abondant sur les *Echium* défloris. Je l'ai pris aussi à Gyé, en août, sur *Cynoglossum officinale*, plante de la même famille que l'*Echium*.

15. *HUMILI*. *Fabr.* — Lusigny, sous des herbes coupées, octobre; bord de la Seine, à Conflans (Marne), près de la frontière de l'Aube, sous les feuilles tombées de *Myosotis palustris*, août. R. Fieber avait déjà constaté cet habitat.

16. *VESICULIFERA*. *Fieber.* — Villechétif, juin, en fauchant dans une localité où abonde la grande consoude. Je crois, avec M. Puton, que cet insecte habite sur cette plante. Je l'ai trouvé aussi en automne et au printemps, dans le même marais, en battant des tas d'herbes et de roseaux. R.

PHYMATIDES.

Phymata. *Latr.*

1. *CRASSIPES*. *Fabr.* — Macey, Bar-sur-Seine, Fouchères, bois de Pont, Villacerf, Saint-Benoît-sur-Vanne, etc. Juin, juillet; en fauchant dans les endroits arides, couverts de grandes herbes, de graminées surtout. A C. Aussi sur les jeunes taillis de chênes (*Populus*). Cet insecte hiverne quelquefois sous la mousse!

ARADIDES.

Aradus. Fabr.

1. CINNAMOMEUS. *Panz.* — Assencières, bois de pins près de la gare; Bar-sur-Seine, sur les pins, avril; Fontvanne, dans des fagots de pin, mars; Pont-Hubert, sous une écorce de saule, février; Saint-Julien?; Rosnay, avril; Villacerf, juin, etc. C. Les exemplaires macroptères sont beaucoup plus rares que les brachyptères.

2. DEPRESSUS. *Fabr.* — Lusigny, sur un tas de bois coupé, été; La Royale, sur des troncs d'arbres, mars, juillet; la Vacherie, au pied d'un peuplier, octobre; Petit Séminaire, quelquefois en nombre, au pied des bouleaux, printemps; Pont-Hubert, sous une écorce de saule, février; Bar-sur-Seine, Estissac, mai. A R.

3. ATERRIMUS. *Fieber.* — Brienne-la-Vieille, mai; Saint-Benoît-sur-Vanne, au pied d'un chêne, avril, octobre. R R. M. Puton ne cite que deux exemplaires de cette espèce, un de Gérardmer (Vosges), l'autre de Toulon.

4. BETULÆ. *Lin.* — Bois de Fiel, près de Bar-sur-Seine, sur du bois équarri (Cartereau); Saint-Martin-ès-Vignes, sur un mur, avril (Laverdet). M. Jules Ray a pris aussi plusieurs exemplaires de cette espèce dans l'Aube, mais je ne sais dans quelle localité. R R.

Aneuris. Curt.

1. LOEVIS. *Fabr.* — Bar-sur-Seine, côte de Notre-Dame, sous des bois de chêne équarris, octobre (Cartereau); Lusigny, étang du Petit-Beaumont, dans un vieux fagot, octobre. R R. Sous l'écorce, au pied des bouleaux (Lethierry).

HÉBRIDES.

Hebrus. Curt.

1. PUSILLUS. *Fall.* — Villechétif, détritus du marais (Laverdet). J'en possède un autre exemplaire pris dans l'Aube, mais je ne sais dans quelle localité. R R.

HYDROMÉTRIDES.

Hydrometra. Latr.

1. STAGNORUM. *Lin.* — Sous les herbes humides, au bord des ruisseaux et des mares; court aussi sur l'eau, à la manière des *Gerris*. Ruisseaux du bois de Fouchy, etc. C C.

Microvelia. West.

1. SCHNEIDERI. *Schltz.* — Villechétif, au bord des mares, avril. R.

Velia. Latr.

1. CURRENS. *Latr.* — Ruisseaux de Fouchy et de la Vacherie, etc. C C.

Gerris. Fabr.

1. NAJAS. *De G.* — Sur la Seine et les ruisseaux d'eau courante; Pont-Hubert, Fouchy, etc. C C.

2. THORAGICA. *Schum.* — Petit ruisseau à sec l'été, entre le petit bois de La Royale et le faubourg Sainte-Savine; Somsois, sur les fossés du château. Avril. R R.

3. LACUSTRIS. *Lin.* — Mêmes localités que la précédente et plusieurs autres encore. C.

4. ARGENTATA. *Schml.* — Somsois, fossés du château. C.

RÉDUVIDES.

Ploiaria. Scop.

1. VAGABUNDA. *L.* — Bord du canal, près de Saint-Julien, en battant les épicias, août; Estissac, sur les arbres; Somsois. R R dans l'Aube. Vit aussi sur les vieux lierres (Dubois).

Var. PILOSA. *Fieber.* — Marais de Pars, août. R R.

Je prends cette variété, considérée comme espèce distincte par Fieber, mêlée avec le type, en battant les épicias à Somsois. Elle n'en diffère guère que par la pilosité beaucoup plus longue de ses pattes et de ses antennes.

2. *CULICIFORMIS*. *De G.* — Cette espèce, commune partout, se trouve certainement dans l'Aube.

3. *BAERENSPRUNGI*. *Dohrn.* — Espèce très remarquable par la grande épine noire située au milieu de la base du prothorax, en face de l'écusson. Cet insecte est nouveau pour la France et extrêmement rare partout. J'en ai pris plusieurs exemplaires à Bucey-en-Othe, en juin et août, en battant de vieux pommiers.

Pygolampis. *Germ.*

1. *BIDENTATA*. *Fourcr.* — La Vacherie, le Labourat, Fouchy, Villechétif; sous les feuilles humides, au bord des fossés et au pied des arbres; Bucey-en-Othe, dans une botte de sarments. J'en ai pris un exemplaire à Villechétif sous un tas d'herbes coupées, en octobre. Février, mars, octobre, novembre; plus rarement l'été. R R.

Reduvius. *Fabr.*

1. *PERSONATUS*. *Lin.* — Le soir, au vol, dans les appartements, l'été. Cet insecte s'abat brusquement, marche avec rapidité, en s'arrêtant soudain de temps à autre. On dit qu'il fait la guerre à la punaise des lits. On rencontre quelquefois, dans les appartements, sa larve qui est grise et recouverte de poussière. Il faut le saisir avec précaution, car il pique cruellement. C.

Pirates. *Serv.*

1. *HYBRIDUS*. *Scop.* — Montgueux, sous la mousse, dans un bois de pins; Bar-sur-Seine, sous des pierres, mars. R R.

Harpactor. *Lap.*

1. *ANNULATUS*. *Lin.* — Le Prédillon, juin, sur *Inula dysenterica*; bois de Macey, en battant des arbres en lisière, juin; Lusigny, bois près de la gare, sur des épicéas; Bar-sur-Seine, dans des fagots, bois de Forêt-Bréard, novembre. R R.

Coranus. *Curtis.*

1. *SUBAPTERUS*. *De G.* — Les Riceys, sous les pierres, dans une friche. Juillet (Laverdet). R R.

Prostemma. *Lap.*

1. *GUTTULA*. *Fabr.* — Montchaud, Montgueux, Droupt-Saint-

Basle, Saint-Martin-la-Fosse, garenne de Juilly. Sous la mousse, dans les bois de pins. Février, mars, avril, août. R.

Les exemplaires macroptères sont beaucoup plus rares que les brachyptères.

Allceorhynchus. Fieber.

1. FLAVIPES. *Fieber.* — J'ai pris un exemplaire brachyptère de cette rare espèce, dont on compte les captures en France, dans le bois de Macey, sous la mousse d'un tronc de chêne, en novembre, et un second dans le bois de Chialot, près d'Estissac, au pied d'un chêne, également en novembre.

Nabis. Latr.

1. BREVIPENNIS. *Hoh.* — Partout, à la fin de l'été et en automne, en battant les arbres et les buissons. J'en ai pris un exemplaire macroptère à Estissac, en octobre. Cette forme est très rare, d'après M. Puton. A C.

2. LATIVENTRIS. *Boh.* — Partout, sous les détritrus, les feuilles sèches, au pied des arbres, presque toute l'année. C C.

D'après M. Puton, les exemplaires macroptères ne se trouveraient que dans le Midi; cependant j'en ai pris au Prédillon, au bord du canal, près de Saint-Julien, et à Somsois.

3. MAJOR. *Costa.* — La Chapelle-Saint-Luc, Saint-Léger-sous-Bréviandes; jardin du Petit Séminaire, dans une vieille ruche; bois près de Bucey-en-Othe, sous la mousse. Juillet, octobre, novembre. R R.

5. FLAVOMARGINATUS. *Scht.* — Maizières-la-Grande-Paroisse, en fauchant dans les prés, juin, juillet. R.

6. LINEATUS. *Dahlb.* — Villechétif, sous des tas d'herbes coupées, et en fauchant au bord d'une mare. Octobre. R R.

D'après M. Puton, c'est une espèce du nord de l'Europe qui n'a encore été trouvée en France que dans les environs de Lille, par M. Lethierry. Elle est signalée de la Somme par M. Dubois.

7. FERUS. *Lin.* — Partout. L'hiver, sous les feuilles, les détritrus, la mousse, au pied des arbres; l'été, sur les plantes et les arbres. C C.

3. RUGOSUS. *Lin.* — Partout, pendant l'été et l'automne. C C. Cette petite espèce pique la main qui la saisit, surtout quand le temps est très chaud.

9. ERICETORUM. *Schtz.* — Plaine de Foolz, Fouchères, juin. En fauchant sur les bruyères, et sous les tas de bruyères coupées. R.
10. BREVIS. *Schtz.* — Fouchères, juin. R.R.

SALDIDES.

Salda. Fabr.

1. SALTATORIA. *Lin.* — Saint-André, la Royale, Bucey-en-Othe, Chenegy, etc. Sur les plantes, au bord de l'eau, sur le sable, sur la vase humide. Une grande partie de l'année. C.C. L'hiver, il se réfugie sous la mousse des troncs d'arbres, souvent fort loin de l'eau.
2. COCKSII. *Curt.* Var. GEMINATA. *Costa.* — Sous la mousse, au pied des peupliers, septembre. Somsois. R.
3. CINCTA. *H. S.* — Villechétif, le Prédillon, Saint-André. Sous les feuilles humides et dans les détritres de l'inondation. Février, octobre, novembre, R.

Leptopus. Latr.

1. BOOPIS. *Fourcr.* — Bar-sur-Aube (J. Ray); Loches, sous une pierre, coteau conduisant au *Point-de-Vue*, septembre. R.R. J'ai trouvé cet insecte en grand nombre, sous des pierres, dans la *Combe aux Serpents*, près de Dijon.

CIMICIDES.

Cryptostemma. H. S.

1. ALIENUM. *H. S.* — Sur les grèves de la Seine, à Foicy, tout à fait au bord de l'eau, mai, juin. C. Ce petit insecte se cache habituellement sous les grèves et s'envole comme une mouche, quand il fait chaud, ce qui le rend difficile à prendre en nombre, bien qu'il soit abondant là où il se trouve. J'ajouterai que son peu de consistance et la mollesse de ses téguments fait qu'il n'est pas facile de le conserver en bon état.

Cimex. Lin.

1. *LECTULARIUS. Lin.* — Trop commun dans les vieilles maisons et dans les appartements mal tenus.

Le *C. columbarius* se trouvera probablement dans les grands colombiers, où il habite les nids des pigeons. Je n'ai pas encore eu l'occasion de l'observer.

Lyctocoris. Hah.

1. *CAMPESTRIS. Fabr.* — Jardin du Petit-Séminaire, sous des tas de foin, mai. Cet insecte se prend aussi communément et partout en battant les vieux fagots, dans les bois. C.C.

Piezostethus. Fieber.

1. *CURSITANS. Fall.* — Route d'Auxerre, en face de Saint-André, sous une écorce de noyer, octobre; Villepart, février (Laverdet); Estissac, sous une écorce de hêtre, février. R.

Temnostethus. Fieber.

1. *PUSILLUS. H. S.* — Bois entre Macey et Fontvanne, juin; Bucey-en-Othe, Estissac, sur les vieux pommiers. Juillet. R R.

Anthocoris. Fall.

1. *NEMORALIS. Fabr.* — Troyes, le Labourat, Villechétif, Argentolle, bord de la Seine, en aval du pont de Saint-Parres, croix des Mottes, etc. Printemps et été, en battant les arbres; l'hiver, sous les écorces de saules, de platanes et d'épicéas. C.

Var. *AUSTRIACUS. Fabr.* — Villechétif, mai. R.

2. *SYLVESTRIS. Lin.* — Sur les arbres, dans les détritiques et les vieux fagots, toute l'année. Troyes, la Chapelle-Saint-Luc, Saint-Julien, Saint-Léger, etc. C.C. Cette espèce se trouve surtout sur les aulnes.

Je possède dans ma collection un exemplaire de l'*A. Gallorum-Ulmi*, de G., *pratensis*, Fieber, mais je ne suis pas sûr qu'il soit de l'Aube.

J'en dirai autant d'un autre *anthocoris* que M. Puton a nommé avec doute *A. Minki* Dohrn. Cette espèce n'est pas signalée de France dans le catalogue Puton.

3. *Visci. Dougl.* — Espèce nouvellement décrite et habitant sur le gui. Bucey-en-Othe, Clérey. Juillet, août. R.

Triphleps. Fieber.

1. *NIGRA. Wolff.* — Cours du Lycée, sur des orties, juin. Verrières. R R.

2. *MINUTA. Lin.* — Sur les marsaults et autres arbustes, dans les fagots: Rosnay, Saint-Julien, Bar-sur-Aube, Saint-Benoît-sur-Vanne, etc. C.C. Les exemplaires provenant de cette dernière localité sont d'une taille plus grande. Serait-ce le *T. Majuscula* de Reuter? M. Puton n'ose pas se prononcer sur ce point.

D'après M. Populus, cet insecte se trouverait dans les fleurs des *Carduus* et des *Cirsium*.

Brachysteles. M. R.

1. *RUFESCENS. Costa.* — Saint-Benoît-sur-Vanne, dans des fagots de chêne, octobre; Estissac, jardin du presbytère, en battant des épicéas. R.

2. *PARVICORNIS. Costa.* — Route de Saint-Parres, Villechétif, Rosnay, etc. L'hiver, sous les écorces de platanes. A C.

Cardiostethus. Fieber.

1. *FASCHVENTRIS. Garb.* — Saint-Benoît-sur-Vanne, en battant des fagots de chêne, en compagnie de *Brachysteles rufescens* auquel il ressemble beaucoup. Octobre. R.

Xylocoris. Duf.

1. *ATER. Duf.* — Les Noës, Droupt-Saint-Basle, sous des écorces de noyers morts, février, octobre; Bar-sur-Seine, mars (Laverdet). R.

Microphysa. West.

1. *PSELAPHIFORMIS. Curt.* — Lusigny? R R.

CAPSIDES.

Pithanus. Fieber.

1. *MÆRKELI. H. S.* — Villechétif, mai; Petit Séminaire, Lusigny, juillet; en fauchant sur les herbes. A R.

Acetropis. Fieber.

1. *CARINATA. H. S.* — Vallée de la Vanne, entre Vulaines et Saint-Benoît-sur-Vanne, la Grange-au-Rez, friche près de Fontvanne, Estissac, etc. Juin. En fauchant dans les endroits secs et herbus. A R. Sur les composées (Populus).

Miris. Fabr.

1. *CALCARATUS. Fall.* — Partout, en fauchant dans les prés, pendant l'été; Villechétif, dans des tas d'herbes coupées, octobre. C. Espèce hivernante. J'en ai pris un exemplaire en février, dans un bois près de Bucey.

Var. *VIRESCENS. Fieber.* — Avec le type et aussi commun.

2. *VIRENS. L.* — Pel-et-Der, Somsois. Avril, en battant les pins. R.

Var. *FULVUS. Fieber.* — Montgueux, Montchaud, Macey, Estissac, Villacerf, etc. Sur les pins. C C. Été, automne. Espèce hivernante. Je l'ai trouvée sous la mousse, en février et au commencement de mars, alors que la terre était couverte de neige.

Le type est fort rare, mais la variété *Fulvus* est très abondante.

3. *LOEVIGATUS. L.* — Partout et toute l'année. L'hiver, sous les feuilles sèches, l'été sur les plantes. C C.

Var. *VIRESCENS. Fall.* — Avec le type, mais moins commun.

4. *HOLSATUS. Fabr.* — Se trouve certainement dans l'Aube, sans que je puisse lui assigner de localités précises.

Megaloceræa. Fieber.

1. *ERRATICA. L.* — En fauchant dans les prés, l'été. C.

2. *LONGICORNIS. Fall.* — Partout, en fauchant dans les prairies, l'été. C.

3. *RUFICORNIS. Fourcr.* — Marais de Pars, sur les grandes herbes; Somsois, en fauchant dans une friche. R R.

Leptopterna. Fieber.

1. *FERRUGATA. Fall.* — Sur les herbes des prairies, dans tout le département. C C.

2. *DOLABRATA. L.* — Avec le précédent et aussi commun.

Pantilius. Curt.

1. **TUNICATUS. Fab.** — Estissac, Lusigny, Bucey, Somsois. Sur les noisetiers. Septembre, octobre. Ce capsidé est un des plus tardifs. Il vivrait aussi sur l'aulne? (Charpentier). Je ne l'ai jamais trouvé que sur le noisetier. A R.

Lopus. Hab.

1. **GOTHICUS. L.** — Fouchères, Lusigny, juin, juillet, en fauchant sur les plantes. R. Sur les épilobes (Lethierry).

Var. **SUPERCILIOSUS. L.** — Juin, juillet; avec le type. R.

2. **SULGATUS, Fieber.** — Petit Séminaire, en fauchant dans les allées herbues; Messon, etc. Juin. A R.

Miridius. Fieber.

1. **QUADRIVIRGATUS. Costa.** — Marais de Pars, Venduvre, prairie près de la ferme de l'Ermitage. Marais entre Chenegy et Bercenay-en-Othe. Août. R.

Phytocoris. Fall.

1. **POPULI. L.** — Fouchères, Fontvaune, Vulaines, Estissac; en battant les arbres, surtout les chênes en lisière. Juin, juillet, août. R.

2. **TILLE. Fabr.** — Sur les tilleuls, dans les cours et les jardins du Petit Séminaire, juillet; Estissac, août, sur les chênes. A R. Aussi sur le peuplier (Lethierry) et l'orme (Dubois).

3. **LONGIPENNIS. Flor.** — Venduvre, Somsois; l'été, en battant les arbres. R. Sur le charme, le chêne, le saule (Puton); sur les peupliers (Lethierry).

4. **PINI. Kb.** — Sur les pins. Somsois, Macey. C.

5. **ULMI. L.** — Sur les arbres l'été, surtout sur les chênes (Dubois). C. Se prend aussi en fauchant sur les grandes herbes. Chenegy, août.

6. **VARIPIES. Boh.** — Partout, en fauchant et sur les arbres. C C.

Calocoris. Fieber.

1. **STRIATELLUS. Fabr.** — Bar-sur-Seine, Venduvre, Macey, Saint-Benoit-sur-Vanne. Mai, juin, en battant les chênes. A C.

2. *SCHMIDTII*. *Fieber*. — Saint-Parres-les-Tertres, propriété de M. Vignes, en fauchant sur les grandes herbes, mai, juin; très abondant, mais localisé.

3. *PILICORNIS*. *Panz.* — Bois de Fouchy, Saint-Parres, Villechétif, etc. Juin. Sur les euphorbes. C C.

4. *BICLAVATUS*. *H. S.* — Troyes, jardins du Lycée et du Petit Séminaire, surtout sur le baguenaudier (*Colutea arborescens*). Aussi sur les tilleuls! Juin, juillet. A C.

5. *FULVOMACULATUS*. *De G.* — Fouchères, Bar-sur-Seine, Fouchy, les Marots, Fontvanne, etc. Sur les arbres. Juin, juillet. A C.

6. *BIPUNCTATUS*. *Fieber*. — Partout, dans les prés, tout l'été. C C.

7. *CHENOPODII*. *Fall.* — Avec le précédent et presque aussi commun. Sur les *Eryngium* (Lethierry).

8. *QUADRIPUNCTATUS*. *Fabr.* — Lusigny, bois près de la gare, juillet; Villechétif, avril. R R.

9. *TIGINENSIS*. *Mey.* — Cette espèce, qui n'était pas indiquée de France dans la deuxième édition du catalogue Puton, n'est pas rare dans le marais de Pars, en fauchant sur les grandes herbes, août. Je ne l'ai pas prise ailleurs dans l'Aube.

10. *VANDALICUS*. *Rossi.* — Friches du bois de Thouan, près de Gyé-sur-Seine; Lusigny; Vendœuvre, forêt du Temple. Juillet, août. R.

11. *SETICORNIS*. *Fabr.* — Partout, en fauchant dans les prairies. Tout l'été. C C.

12. *ROSEOMACULATUS*. *De G.* — Vulaines, Macey, Droupt-Saint-Basle, etc. Tout l'été. C C. Sur les *Chrysanthemum* (Puton).

13. *MARGINELLUS*. *Fabr.* — Partout, en fauchant dans les prés. C C. Sur la bryone (Robineau-Desvoidy).

Megacœlum. *Fieber*.

1. *INFUSUM*. *H. S.* — Somsois, Montgueux, Bar-sur-Seine; sur les pins, juillet, août. R. Aussi sur le chêne et le tilleul.

Pycnopterna. *Fieber*.

1. *STRIATA*. *L.* — Saint-Benoît-sur-Vanne, Bar-sur-Seine,

Vendeuvre, Macey, Villemaur, Fouchères, Estissac, Les Marots, etc. En battant les chênes; mai, juin. A C.

Brachycoleus. Fieber.

1. BIMACULATUS. *Ramb.* — Vallée de la Vanne, entre Vulaines et Saint-Benoît-sur-Vanne; Saint-Parres, Fontvanne, Droupt-Saint-Basle, Lusigny, etc. Sur *Eryngium campestre*. Juin, juillet. C.

2. SCRIPTUS. *Fabr.* — J'ai pris en certain nombre cette belle espèce, probablement nouvelle pour la France, à Bar-sur-Seine, val de Verrières, dans une friche près de Gyé-sur-Seine, et aux Riceys, en juillet. D'après Fieber, elle habiterait, comme sa congénère, sur les *Eryngium*; sans être en mesure de contester cette indication, je dois dire que je la prends dans des localités où cette plante ne se rencontre pas. Je l'ai prise en nombre aux Riceys, en fauchant sur des panais sauvages, mais je n'oserais pas en conclure qu'elle habite ordinairement sur cette plante.

Oncognathus. Fieber.

1. BINOTATUS. *Fabr.* — Troyes, Bar-sur-Seine, Lusigny, bois de Thouan, etc. Cette espèce est commune partout, pendant l'été, sur l'herbe des prairies. Elle est tantôt d'un jaune très pâle, tantôt d'un orangé fort vif.

Dichrooscytus. Fieber.

1. RUFIPENNIS. *Fall.* — Charmont, Assencières, Fontvanne, Villacerf, sur les pins. Juin. R.

LYGUS. Hal.

S.-g. Lygus. Fieber.

1. PRATENSIS. *Fabr.* — Partout. L'été, sur les plantes; l'hiver, sous la mousse. C C.

2. CAMPESTRIS. *Fabr.* — Comme le précédent et aussi commun.

3. RUBRICATUS. *Fall.* — Somsois. Vit sur les sapins, dans les Vosges! aussi sur les mélèzes (de Norguet, Cat. Lethierry).

4. CONTAMINATUS. *Fall.* — Troyes. R R.

5. LUCORUM. *Mey.* — Lusigny. Juillet. Sur les osiers (*Populus*).

6. *PABULINUS*. *L.* — Somsois. R.

7. *VISCI*. *Puton.* — Espèce nouvellement décrite par M. Puton. Sur le gui des pommiers et des peupliers. Bucey-en-Othe, Lusigny (Lumiot), Vendevre, forêt du Temple, Clérey, Chenegy. Juillet, août. A R.

S.-g. *Orthops*. *Fieber.*

1. *PASTINACÆ*. *Fall.* — Somsois; bord du canal, près de Bréviandes, Les Riceys, etc. Commun sur les ombellifères, surtout sur le panais sauvage.

2. *CERVINUS*. *H. S.* — Jardin du Petit Séminaire. R R.

3. *KALMI*. *L.* — Partout, sur les ombellifères. C C.

Var. *FLAVOVARIUS*. *Fabr.* — Avec le type.

4. *PELLUCIDUS*. *Fieber.* — Localité inconnue.

Cyphodema. *Fieber.*

1. *RUBICUNDA*. *Fall.* — La Royale, Villechétif, Rosnay. Espèce hivernante. Février, mars, avril. L'hiver, sous les feuilles sèches, au pied des arbres; au printemps, sur les saules. A R. Aussi sur les aulnes (Puton) et les chênes (Dubois).

2. *INSTABILIS*. *Luc.* — Montieramey, juillet; Chenegy, août. R R.

Pæciloscytus. *Fieber.*

1. *GYLLENHALI*. *Fall.* — Droupt-Saint-Basle, Vendevre, Montgueux, etc. Mars, octobre. C. Sur les *Galium*. L'hiver, sous la mousse.

2. *HOLOSERICUS*. *Hab.* — Jardin du Petit Séminaire, Fouchy. Juillet. R.

3. *UNIFASCIATUS*. *Fabr.* — Partout. Commun, l'été, sur les *Galium*.

Camptobrochis. *Fieber.*

1. *LUTESCENS*. *Schill.* — Troyes, La Chapelle-Saint-Luc, Saint-Parres, Somsois, etc. Sur les tilleuls, les chênes, les noisetiers. Se trouve quelquefois l'hiver sous les écorces de saules. C.

Liocoris. *Fieber.*

1. *TRIPUSTULATUS*. *Fabr.* — Jardin du Petit Séminaire, etc. Sur les orties; l'été. C C.

Capsus. Fabr.

1. *TRIFASCIATUS. L.* — Bois entre Macey et Fontvanes, sur les chênes en lisière et les prunelliers ; Le Prédillon, sur des oseraies ; Somsois. Juin. Aussi sur le coudrier (Puton).

Cette espèce, abondante il y a quelques années, a disparu depuis qu'on a coupé les chênes où je la prenais.

Je prends avec le type les trois variétés suivantes :

Var. *REGALIS. Horv.* — Corselet et élytres entièrement rouges, sauf, chez ces dernières, le cuneus qui est noir ordinairement et une petite tache de même couleur avant l'extrémité ; tête noire, yeux rouges ; antennes noires, sauf le quatrième article et la base du troisième qui sont rouges ; poitrine noire à côtés rouges ; abdomen rouge avec une raie noire au milieu et les premiers anneaux bordés de noir ; cuisses noires ; tibias noirs annelés de jaune ; tarses rougeâtres.

Var. *RUFIPES. F.* — Entièrement noire, sauf les antennes qui sont rouges avec le deuxième article noir dans son tiers postérieur, les cuisses qui sont rouges, rayées de noir en dessus, et les tibias qui sont annelés de rouge et de noir.

Var. *ULTRAMONTANUS. Gredl.* — Semblable à la précédente, sauf les cuisses qui sont noires.

Ces trois remarquables variétés sont plus rares que le type.

2. *LANIARIUS. L.* — Très commun partout, l'été, avec ses deux variétés *damicus* et *tricolor*. Sur les orties (Populus).

3. *OLIVACEUS. F.* — La Charme (Laverdet) R R.

Rhopalotomus. Fieber.

1. *ATER. L.* — Le type de cette espèce est rare dans l'Aube. Les deux variétés *tyrannus* et *flavipes*, ♀ sont au contraire fort communes l'été, en fauchant sur les plantes.

Pilophorus. Hah.

1. *CINNAMOPTERUS. Kb.* — Montgueux, Neuville-sur-Seine, bois de pins en face de la gare de Messon, en battant les pins ; Estissac, sur des tilleuls. Juillet, août, octobre. A R. Aussi sur les saules, les chênes, les pommiers (Puton) et les frênes (Dubois).

2. *PERPLEXUS. Scott.* — Bord du canal, près de Bréviandes, sur des épicéas. Août. R R.

3. *CLAVATUS. L.* — Pont-Hubert, sur les saules, Juin. R R.

Systellonotus. Fieber.

1. *TRIGUTTATUS. Lin.* — En fauchant sur les graminées, Villechétif, mai. R.R. Sur le serpolet (Dubois).

Eroticoris. Dgl.

1. *RUFESCENS. Burm.* — J'ai pris un exemplaire de cette espèce dans le marais de Saint-Gond, près de Reuves (Marne). Il est probable qu'elle habite aussi nos grands marais.

Halticus. Burm.

1. *LUTEICOLLIS. Panz.* — Bois de Thouan, près de Neuville-sur-Seine, en fauchant sur les herbes, à la lisière du bois, juillet. Je l'ai pris aussi dans d'autres localités que je n'ai pas notées. Juillet. A.R.

2. *APTERUS. L.* — Jardin du Petit-Séminaire, etc. En fauchant dans les allées herbues. Été. C.

3. *SALTATOR. Hah.* — Localité inconnue. Dans les prés.

Cyrtopeltis. Fieber.

1. *GENICULATA. Fieber.* — Somsois. Espèce méridionale vivant sur les *Ononis* (Puton); sur les résédas et les genêts (*Populus*).

Dicyphus. Fieber.

1. *ERRANS.* — Sous la mousse et en fauchant. A.R. Sur *Stachys sylvatica* (Lethierry).

2. *ANNULATUS. Wolff.* — Comme le précédent. R. Sur les *Ononis* (Lethierry).

3. *EPILOBII. Wolff.* — Somsois. Septembre. Sur les épilobes.

Campyloneura. Fieber.

1. *VIRGULA. H. S.* — Jardin du Petit-Séminaire, Lusigny; en battant les arbustes et en fauchant; quelquefois aussi sous la mousse. Été. C. D'après M. Puton, elle vit exclusivement sur l'aulne. D'après M. Dubois, elle se trouverait aussi sur les chênes, peut-être accidentellement.

Cyllocoris. Hah.

1. *HISTRIONICUS. L.* — Macey, Saint-Benoît-sur-Vanne, Fouchères, Bar-sur-Seine; en battant les chênes sur la lisière des bois. Mai, juillet, août. C.

2. *FLAVONOTATUS*. *Bohm.* — Vendevre, Fouchères. Mai, juillet; dans les allées herbues des bois. RR. Sur les aulnes et les ormes (Dubois).

Globiceps. *Latr.*

1. *SPHEGIFORMIS*. *Rossi.* — Saint-Benoît-sur-Vanne, Fontvanne, Bar-sur-Seine. Juin, juillet. Sur les chênes. R.

2. *FLAVOMACULATUS*. *Fabr.* — Partout, tout l'été, en fauchant dans les prairies. CC.

Orthotylus. *Fieber.*

1. *MARGINALIS*. *Reut.* — Foicy. Juillet. Sur les saules, au bord de la Seine. RR.

2. *CONCOLOR*. *Kirb.* — Bucey, en battant de vieux pommiers. Juillet. R. Cette espèce vit sur le genêt (Puton).

3. *PRASINUS*. *Fall.* — Jardin du Petit Séminaire. Sur les arbres. Estissac. Août. R.

Heterotoma. *Latr.*

1. *MERIOPTERA*. *Scop.* — Jardin du Petit-Séminaire, Bar-sur-Seine, Estissac, etc. En fauchant sur les grandes herbes. Juin, juillet. AC. Sur le coudrier, le chèvrefeuille (Puton), sur l'ortie (Amyot), sur l'aulne (Lethierry), sur le saule (Dubois), sur *Rubus fruticosus* (Populus).

Heterocordylus. *Fieber.*

1. *TUMIDICORNIS*. *H. S.* — Bar-sur-Seine. Juin. R. Sur le prunellier (Puton), le *Genista scoparia* (Dubois).

2. *GENISTÆ*. *Scop.* — Bar-sur-Seine, Fouchères, Fontvanne, Estissac, etc. Juin. Sur *Genista scoparia*. CC. Aussi sur *Genista anglica* et *Ulex europæus* (Lethierry).

Malacocoris. *Fieber.*

1. *CHLORIZANS*. *Fall.* — Jardin du Petit Séminaire, sur les tilleuls. Juillet. R. Aussi sur les jeunes pousses des bouleaux (Lethierry).

Onychumenus. *Reuter.*

1. *DECOLOR*. *Fall.* — Somsois. Sur *Chrysanthemum leucanthemum* (Lethierry).

Eurycolpus. Reuter.

1. FLAVEOLUS. *Stal.* — Friches en face de Neuville-sur-Seine. Été. Sur les *Ononis*. C.

Oncotylus. Fieber.

1. VIRIDIFLAVUS. *H. S.* — Villechétif. Juillet. R R. Sur la menthe aquatique, les *Rumex* (Dubois).

Piacochilus. Fieber.

1. SELADONICUS. *Fall.* — Gyé-sur-Seine, en fauchant dans une friche. Août. R.

Hoplomachus. Fieber.

1. THUNBERGI. *Fall.* — Lusigny, Fontvanne, Bar-sur-Seine, Villacerf. Sur *Hieracium pilosella*. C. Aussi sur le *Chrysanthemum leucanthemum* (Lethierry, Dubois).

Macrocoleus. Fieber.

1. MOLLICULUS. *Fall.* — Les Marots et autres localités. En fauchant sur les plantes. Juin, juillet. C. Sur l'*Achillea millefolium* (Puton).

Amblytylus. Fieber.

1. AFFINIS. *Fieber.* — Lusigny, Bar-sur-Seine, etc. En fauchant. Juin, juillet. C.

Macrotylus. Fieber.

1. HERRICHI. *Reut.* — Bar-sur-Seine, en fauchant sur *Salvia pratensis*. Juillet. Abondant, mais localisé. Aussi sur *Mentha arvensis* (Dubois).
2. SOLITARIUS. *Mey.* — Lusigny. Juillet. R R.
3. PAYKULII. *Fall.* — Partout, sur les bugranes, l'été. C C. Aussi sur les résédas (*Populus*).

Harpocera. Curt.

1. THORACICA. — Montiéramey. R R. Sur le chêne (Puton).

Phylus. Hah.

1. MELANOCEPHALUS. *Lin.* — Macey, Saint-Benoît-sur-Vanne.

En battant les chênes. Juin. C. Aussi sur les rosiers (Puton); sur les chênes et les noisetiers (Dubois).

2. *CORYLI. Lin.* — Petit Séminaire, Fontvannes, etc. Sur les noisetiers. Juin. C.C.

Var. *AVELLANÆ.* — Beaucoup plus rare que le type.

Psallus. Fieber.

1. *AMBIGUUS. Fall.* — Somsois, Villechétif. R. Sur les saules et les ormes (Carpentier).

2. *BETULETI. Fall.* — Fouchères. Juin. R.

3. *QUERCUS. Kb.* — Macey, Bar-sur-Seine. Juin. Sur les chênes. C. Aussi sur les ormes (Dubois).

4. *DIMINUTUS. Kb.* — Villechétif. Juin. R. Sur les saules (Dubois).

5. *SALICELLUS. Mey.* — Somsois, Vendevre. Août, octobre. R. Sur les saules (Dubois).

Atractotomus. Fieber.

1. *MALI. Mey.* — Bucey-en-Othe, sur les vieux pommiers. D'après M. de Norguet, il vit dans les nids des chenilles de l'*Hypnomenuta padella*, sur les haies d'aubépine. Juillet. R.R. Aussi sur le prunellier (Puton).

2. *MAGNICORNIS. Fall.* — Somsois. Août. R.R. Sur les conifères (Puton).

Plagiognathus. Fieber.

1. *VIRIDULUS. Fall.* — Lusigny, Estissac, Bucey-en-Othe. Sur les épicéas, les pommiers. Juin, juillet. A.C.

2. *FULVIPENNIS. Kb.* — Le Prédillon. A.C.

3. *ARBUSTORUM. Fabr.* — Lusigny, Foicy, etc. Juillet. En fauchant dans les prairies. C.

4. *ALBIPENNIS. Fall.* — Somsois. R.R. Sur les saules (Puton). Aussi sur l'absinthe maritime (Dubois).

Chlamydatus. Curtis.

1. *EVANESCENS. Boh.* — Vignes au-dessus de Fontvanne, sous les touffes de *Sedum acre*. Juillet. R.

1. H
sur les
2. N
(Dubois)

1. A
Seine. B

1. V
Sur le g

1. P
Troyes,
M. P
vieux p
J'ai p
ficus R

Neocoris. Dgl. S.

1. *BOHEMANI. Zett.* — Bord de la Seine, au Perthuis; Foicy, sur les saules. L'été. A C.
2. *NIGRITULUS. Zett. Var. PUTONI. Reut.* — Sur le saule nain (Dubois).

Campylomma. Reut.

1. *ANNULIGORNIS. Sign.* — Foicy, sur les saules, au bord de la Seine. R R.

Sthenarus. Fieber.

1. *VISCICOLA. Puton.* — Nouvelle espèce décrite par M. Puton. Sur le gui. Lusigny (Lumirot), Bucey-en-Othe, Clérey. Juillet. R.

Isometopus. Fieber.

1. *INTRUSUS. H. S.* — Un exemplaire dans un jardin de Troyes, en juillet, sur des fleurs de persil (Laverdet).
M. Puton m'a fait prendre cet insecte à Remiremont, sur un vieux pommier, en août.
J'ai pris, à Saint-Genis-Laval, près de Lyon, l'*Isometopus mirificus* Rey, sur des poiriers, en septembre.

II. — HYDROCORISÆ.

PELOGONIDES.

Cette famille n'est pas représentée dans l'Aube. Le *Pelagonus marginatus* ayant été observé dans l'Yonne, département limitrophe, il n'est pas impossible qu'on le rencontre aussi dans le nôtre.

NAUCORIDES.

Naucoris. Stål.

1. CIMICOIDES. *Lin.* — Dans toutes les mares et flaques d'eau. CC.
2. MACULATUS. *Fabr.* — Moins commun que le précédent. Marais de Villechétif; gravières de la Vacherie. A C.

NÉPIDES.

Nepa. Lin.

1. CINEREA. *Lin.* — Villechétif; la Seine, au Pont-Hubert, etc. CC.

Ranatra. Fabr.

1. LINEARIS. *Lin.* — Villechétif, dans les petites mares; la Seine, au Pont-Hubert. Octobre. A R.

Cet insecte, comme le précédent, marche sur la vase, au fond de l'eau.

NOTONECTIDES.

Notonecta. Lin.

1. GLAUCA. *Lin.* — Dans toutes les mares et flaques d'eau, et aussi dans la Seine. C.C.

Var. MARMOREA. *Fabr.* — Avec le type; moins commun.

Var. FURCATA. *Fabr.* — Somsois; fossés du château. R.

Plea. Leach.

1. MINUTISSIMA. *Fabr.* — Marais de Villechétif; la Seine, au Pont-Hubert; Somsois, fossés du château. C.C.

CORIXIDES.

Corixa. Geoffroy.

1. GEOFFROYI. *Leach.* — Marais de Villechétif; Somsois, fossés du château, etc. C.C.

2. DENTIPES. *Thoms.* — Somsois, fossés du château, avec l'espèce précédente, mais beaucoup plus rare.

3. HELLENSI. *Sahlb.* — La Seine, au Pont-Hubert, octobre. R.

4. SAHLBERGI. *Fieber.* — Villechétif; la Seine, au Pont-Hubert; Somsois, etc. C.C.

5. LINNEI. *Fieber.* — Villechétif, Somsois. A R.

6. STRIATA. *Lin.* — La Seine, au Pont-Hubert; Somsois, fossés du château. C.C.

7. FALLENII. *Fieber.* — Avec la précédente et encore plus commune.

8. MOESTA. *Fieber.* — Villechétif, Somsois. A C.

9. FOSSARUM. *Leach.* — Marais de Villechétif, petit ruisseau à la Vacherie. Avril, juillet. A R.

10. FABRICII. *Fieber.*

11. COLEOPTRATA. *Fabr.* — Marais de Villechétif, dans les petites mares, parmi les *Chara*. C.

Extrait des Mémoires de la Société Académique de l'Aube
Tome LIV. — 1890
