

Remarques sur la distribution géographique de l'*Erebia Medusa* [Lép.]

Louis Demaison

Citer ce document / Cite this document :

Demaison Louis. Remarques sur la distribution géographique de l'*Erebia Medusa* [Lép.]. In: Bulletin de la Société entomologique de France, volume 1 (7), 1896. p. 186;

doi : <https://doi.org/10.3406/bsef.1896.21815>

https://www.persee.fr/doc/bsef_0037-928x_1896_num_1_7_21815

Ressources associées :

Erebia Medusa

Fichier pdf généré le 09/11/2021

Remarques sur les Lépidoptères du Laos tonkinois.
Rapport de la Faune lépidoptérologique avec celle de l'archipel malais,
par ARMAND JANET.

Des espèces considérées comme distinctes et volant ensemble sans se confondre dans d'autres pays sont remplacées dans le haut Tonkin par des formes intermédiaires dont les individus tendent parfois à se rapprocher assez valablement des types extrêmes. C'est le cas pour *Prioneris Thestylis* et *Prioneris Watsoni*, remplacés au Laos par une forme qui a le dessin très marqué de *Thestylis* avec les nuances caractéristiques de *Watsoni*. C'est encore le cas pour *Papilio Ganesa*, si remarquable pour sa belle tache verte constante, et *Papilio Bianor*, qui en est entièrement dépourvue; ils sont représentés au Laos par une forme à taches restreintes, aux nuances bleues peu tranchées.

Un autre trait assez inattendu indique un caractère qui rapprocherait plutôt la Faune tonkinoise de la Faune de l'archipel malais plutôt que de celle du continent indien. C'est la tendance à la disparition des queues chez certains *Papilio* (c'est ainsi que *Nicanor*, non caudé, remplace dans certaines îles *Polytes* franchement caudé du continent). Au Tonkin se trouve une Faune voisine de *Bianor* et non caudée, qui n'a pas été décrite jusqu'à ce jour et dont le faciès est nettement insulaire.

Je me propose de faire figurer au fur et à mesure de leur description les espèces curieuses du Laos tonkinois.

Remarques sur la distribution géographique de l'EREBIA MEDUSA [LÉP.],
par L. DEMAISON.

L'*Erebia Medusa*, Fab., dont les exemplaires que j'offre à la Société ont été recueillis dans la forêt d'Épernay, est très commune sur toutes les collines qui s'étendent à l'Est du bassin de la Seine, depuis le département de l'Aisne (environs de Saint-Quentin), jusqu'à celui de l'Aube. On l'a signalée récemment pour la première fois dans la forêt de Fontainebleau. Elle paraît être en voie d'extension, et offre une tendance à se multiplier de plus en plus; on la trouve aujourd'hui dans quelques localités où elle manquait autrefois; mais elle n'atteint pas encore les environs de Paris, elle existe près de Fère en Tardenois et sans doute aussi dans la forêt de Villers-Cotterets; nous ne croyons pas qu'on l'ait rencontrée plus près de la capitale.