

Une excursion dans le Jura

par M. Duquet

Après un mois de Juillet désastreux dans le nord de la France, Août 1974 s'annonçait tout aussi pluvieux. Toutefois dès le 13 de ce mois, le temps se remettait au beau, et le 14, par une chaleur caniculaire nous partions dans le Doubs, pour un voyage familial. Au cours du voyage, un premier arrêt dans une carrière calcaire près de Courrot (Marne), nous permit de capturer plusieurs *Issoria lathonia* L. espèce banale certes, mais non rencontrée dans la Somme depuis plus de vingt ans ; peut-être ce nymphalidae est-il endigène en Champagne ? Deux mâles de *Lycaeides argyrognomon* Bergstrasser y furent aussi pris. Quelques pieds de *Gentiana cruciata* fleurissaient en haut du talus, mais probablement trop peu nombreux pour nourrir le *lycaenidae* *Maculineaalconrebeli* Hirschke, dont ce n'était d'ailleurs plus l'époque de l'imago.

Après un autre arrêt dans une friche, près de Chassigny (Haute-Marne), où volaient quelques rares *Melitaea phoebe* Schiff. de seconde génération, nous arrivions vers 19h en vue de Besançon, où nous passions la nuit à " La belle étoile " (nom d'un faubourg de Besançon) chez notre collègue Francis Lapauw ; notons que ce soir-là une courte chasse de nuit au Ravin de Bonnevaux nous procura quelques *Gnophos furvata* S.V., grande géomètre, absente semble-t-il de notre Picardie.

Les conditions climatiques étant passées d'un extrême à un autre, une chaleur étouffante régna du 14 au 17 Août, puis s'atténua un peu ensuite ; ce fut pratiquement le seul moment de beau temps que nous connaissions cet été, après le froid et la pluie qui sévissaient dans le Nord et les Ardennes. Le 15, une chasse de jour au Ravin de Bonnevaux, par un soleil accablant nous permit de rencontrer *Iphiclides podalirius* L., espèce autrefois commune au sud d'Amiens, mais qui en est disparue. *Minois dryas* Scop. et *Erebia meolans* De prunner (*stygne* Ochs.) sont communs sur les pentes. *Hesperia comma* L. y vole aussi, parmi des satyrides et des lycènes ubiquistes. Le même jour à Bousières, *Fabriciana adippe* Schiff. et *Cyaniris semiargus* Rott. volent dans les champs de luzerne, tandis que dans les friches voisines de rares *Brintesia circe* Fab. y sont capturés. Quelques heures après, au sommet de Scey le castel sont rencontrés : *Strymonidia spini* Schiff., *Melitaea didyma* Esp., *Hipparchia fagi* Scop. et encore *Erebia meolans*.

Après une journée passée à suer à grosses gouttes dans des friches arides et des coteaux escarpés, combien est plus agréable le lendemain où une excursion dans les forêts de sapins du Défilé d'entre portes (près de Pontarlier) nous fait rencontrer quelques *Erebia ligea* et surtout une fraîcheur reposante. Le 17 Août est consacré à la visite de la célèbre tourbière des Bussey, qui à cette époque n'en mérite plus que le nom tant elle est desséchée ; heureux Jurassiens qui n'ont

pas eu de pluies depuis plusieurs semaines ! Végétation et faune relictées existent ici dans ce qui sera bientôt, espérons-le une réserve naturelle, et qui sera alors à l'abri des agissements condamnables des sociétés qui exploitent la terre de bruyère, détruisant ainsi des biotopes uniques comme cela se passe dans le département voisin du Jura. Par endroit un épais tapis de *Vaccinium uliginosum*, où se mélange un peu la myrtille s'étend sous une plantation claire de pins, tandis qu'ailleurs parmi les sphaignes poussent : *Oxycoccus palustris*, *Parnassia palustris*, des *eriophorum*, la bistorte, et bien d'autres plantes rares. La meilleure époque pour les rhopalocères de tourbières était passée, aussi c'est avec surprise que nous capturons un mâle et deux femelles de *Colias palaeno* L., presque frais. Notons que sur une petite butte sèche, jouxtant la tourbière, et d'où est venu un *Colia hyale* (= *australis*, pour ceux qui reconnaissent les deux espèces) que nous avons pris sur le moment pour un *palaeno*, poussait une touffe de *Gentiana cruciata* abritant sur ses fleurs deux oeufs blancs, tels ceux de *Maculinea alcon rebeli* Hirschke ; il serait donc intéressant de vérifier la présence fin juin, début juillet de ce *Lycaenide*, si près d'un biotope où il est plus normal d'y rencontrer la forme inféodée à *Gentiana pneumonanthe*.

Après une visite à la ville suisse de La Chaux de Fond, et après avoir admiré les paysages grandioses des gorges de la vallée du Doubs, le voyage de retour par la Lorraine nous procura l'occasion de chasser de nuit dans la Forêt de Clerjus (Vosges) le 18 Août ; les quelques hétérocères suivants vinrent à nos lampes : *Bomolocha crassalis* F. (*hypeninae* parasite de la Myrtille), *Amphipoea oculata* L., *Cryphia ravula* Hb. *Clostera pigra* Hfn. etc...

Peu pressés de rentrer, et désireux de profiter du soleil qui manqua tant en Picardie, un détour nous permettait de parcourir une fois encore la région si intéressante des Ardennes et d'allumer nos lampes U.V. dans la tourbière des Hauts Buttés, le 21 Août : 2 ex. du race *Celaena haworthi* Cast furent attirés, ainsi que de nombreux *Amphipoea fucosa* Frr., à notre surprise, car nous sommes plus habitués à rencontrer cet *Amphipyrae* dans les marais saumâtres de la Baie de Somme, qu'à l'intérieur des terres.

Notons que la capture de *Hydraecia petasitis* Dbld. près d'Ornans (Doubs), ainsi que les résultats d'une chasse nocturne dans la tourbière du Russey seront relatés dans le bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse.

Terminons cette petite note, plutôt souvenir d'un court voyage ensoleillé dans des régions si belles et encore si peu connues des Lépidoptéristes, en remerciant notre ami bisontin (de fraîche date !) Francis Lapauw, qui nous guida à travers son pays d'adoption.