

plusieurs, très jeunes individus (1cm environ de longueur) les 3 et 4 Août 1975, lors de chasses nocturnes aux lépidoptères, sur la plage de la Mollière. Le phototropisme positif de cet insecte est donc ainsi confirmé.

Rappelons la capture récente d'une femelle (Août 1974) dans le parc orpithologique du Marquenterre, à Saint Quentin en Tourmont, par Maurice Goulliart (Bulletin de la Société Entomologique du Nord de la France n° 193). Le forficule labidura riparia est donc présent sur tout le littoral de la Somme et n'est pas d'une grande rareté. Notons que les localités de la Somme (1) semblent être isolées puisqu'il faut aller jusqu'au littoral du Finistère pour le retrouver.

(1) Dans le n° 195 du Bulletin de la Société Entomologique du Nord, M. Goulliart indique que riparia existe aussi aux environs de la Baie de Canche (Pas-de-Calais).

1er Mai ardennais

M. Duquet

Profitant du "pont" du 1er Mai, nous décidions d'aller faire quelques chasses dans cette belle région ardennaise, notamment au village des Hauts Buttés, célèbre pour ses tourbières. Un incident mécanique nous immobilisera pendant trois jours aux Hauts Buttés, modifiant un peu notre programme ! D'autre part si le 1er et le 2 Mai furent ensoleillés (mais avec un vent froid) le samedi 3 fut épouvantable : rafales de vent, tonnerre, averses de grêle et de neige... les bas-côtés des routes commencent même à blanchir et à reprendre un aspect hivernal. Début avril il y avait encore des congères de neige de 2 mètres par endroits, et même en ce début mai la forêt ardennaise commençait tout juste à reverdir, et les promeneurs du 1er mai repartaient en guise de muguet, avec des bouquets de jonquilles (alors qu'à Amiens, par exemple, ces mêmes jonquilles étaient fanées depuis longtemps).

Ce n'est pas étonnant si la plupart des lépidoptères furent des espèces qu'on rencontre plutôt en Mars-Avril dans des régions plus clémentes et par des printemps plus normaux.

Très peu d'espèces furent rencontrées de jour, citons :
Eu Vanessa antiopa L., *Eudia pavonia* L., *Aglia tau* L. et quelques
Gonepteryx rhamni L.

Deux chasses de nuit furent organisées, malgré des températures glaciales, quelques espèces intéressantes furent cependant capturées :

Liste des Hétérocères pris les 1er et 2 Mai aux Hauts-Buttés

Noctuidae

Orthosia stabilis S.V. commun
Orthosia gothica L. commun
Orthosia incerta Hfn. commun
Orthosia miniosa S.V. 2 ex.
Orthosia munda S.V. 1 ex.
Orthosia populeti F. 1 ex.
Cerastis rubricosa S.V. commun

Thyatiridae

Polyploca ridens F. 6 ex.

Notodontidae

Odontesia carmelita Esp. 3 ex.
Drymonia chaonia Hb. 1 ex.

Geometridae

Trichopteryx carpinata Borkh 2 ex.
Biston strataria Hfn. 1 ex.
Ectropis bistortata Goeze 3 ex.
Eupithecia : 2 ex. non encore déterminés

Tineidae

Chimabacche fagella F. 3 ex.

Notons pour terminer l'accueil agréable que nous reçûmes à l'Auberge des Hauts-Buttés, dont les propriétaires, amoureux de l'Ardenne et de sa forêt, sauront vous parler avec émotion de leur région et vous diront leurs regrets tout comme nous-mêmes, devant l'exploitation abusive des arbres, le remplacement des feuillus par des résineux, l'assèchement des tourbières etc.. L'office National des Forêts semble être mal vu, dans ce pays, comme partout ailleurs, mais ceci est une autre histoire !