

Compte rendu de la réunion du 7 juillet 1956

Le président M. Künzle ouvre la séance à 20 heures par la présentation des périodiques reçus.

Nous avons le plaisir d'enregistrer les adhésions de deux nouveaux membres :

M. R. Galliard, pharmacien, Reun- gny (I. et L.).

M. Denis Sella, chirurgien-dentiste, 18, promenade de la Sella, Metz-Queuleu (Moselle).

Nous souhaitons à nos nouveaux collègues une très cordiale bienvenue.

Messieurs Deninguer et Bauglin nous présentent : 1) quelques Lépidoptères tels : *Araschnia prosa* L., *Araschnia* L., *Lysipha* Brün. 2) des chenilles vivantes de *Hylotus p. nassii* L.

M. Künzle nous rend attentifs sur les importants dégâts causés dans certains pâturages des Vosges par la chenille du *Charaxes graminis* L. Les régions les plus atteintes sont le Rossberg et le Kahlewasen.

Avant de présenter les préparations d'armures génitales mises à notre disposition par notre éminent collègue le Dr. Lortz, M. Künzle nous entretient de l'anatomie et du fonctionnement de l'appareil génital mâle et femelle des Lépidoptères, avec des dessins à l'appui. Puis nous observons au binoculaire de nombreuses préparations.

M. Künzle nous rend attentifs sur les importants dégâts causés dans certains pâturages des Vosges par la chenille du *Charaxes graminis* L. Les régions les plus atteintes sont le Rossberg et le Kahlewasen.

Avant de présenter les préparations d'armures génitales mises à notre disposition par notre éminent collègue le Dr. Lortz, M. Künzle nous entretient de l'anatomie et du fonctionnement de l'appareil génital mâle et femelle des Lépidoptères, avec des dessins à l'appui. Puis nous observons au binoculaire de nombreuses préparations.

M. Künzle nous rend attentifs sur les importants dégâts causés dans certains pâturages des Vosges par la chenille du *Charaxes graminis* L. Les régions les plus atteintes sont le Rossberg et le Kahlewasen.

Avant de présenter les préparations d'armures génitales mises à notre disposition par notre éminent collègue le Dr. Lortz, M. Künzle nous entretient de l'anatomie et du fonctionnement de l'appareil génital mâle et femelle des Lépidoptères, avec des dessins à l'appui. Puis nous observons au binoculaire de nombreuses préparations.

M. Künzle nous rend attentifs sur les importants dégâts causés dans certains pâturages des Vosges par la chenille du *Charaxes graminis* L. Les régions les plus atteintes sont le Rossberg et le Kahlewasen.

Avant de présenter les préparations d'armures génitales mises à notre disposition par notre éminent collègue le Dr. Lortz, M. Künzle nous entretient de l'anatomie et du fonctionnement de l'appareil génital mâle et femelle des Lépidoptères, avec des dessins à l'appui. Puis nous observons au binoculaire de nombreuses préparations.

M. Künzle nous rend attentifs sur les importants dégâts causés dans certains pâturages des Vosges par la chenille du *Charaxes graminis* L. Les régions les plus atteintes sont le Rossberg et le Kahlewasen.

Avant de présenter les préparations d'armures génitales mises à notre disposition par notre éminent collègue le Dr. Lortz, M. Künzle nous entretient de l'anatomie et du fonctionnement de l'appareil génital mâle et femelle des Lépidoptères, avec des dessins à l'appui. Puis nous observons au binoculaire de nombreuses préparations.

M. Künzle nous rend attentifs sur les importants dégâts causés dans certains pâturages des Vosges par la chenille du *Charaxes graminis* L. Les régions les plus atteintes sont le Rossberg et le Kahlewasen.

Avant de présenter les préparations d'armures génitales mises à notre disposition par notre éminent collègue le Dr. Lortz, M. Künzle nous entretient de l'anatomie et du fonctionnement de l'appareil génital mâle et femelle des Lépidoptères, avec des dessins à l'appui. Puis nous observons au binoculaire de nombreuses préparations.

M. Künzle nous rend attentifs sur les importants dégâts causés dans certains pâturages des Vosges par la chenille du *Charaxes graminis* L. Les régions les plus atteintes sont le Rossberg et le Kahlewasen.

Avant de présenter les préparations d'armures génitales mises à notre disposition par notre éminent collègue le Dr. Lortz, M. Künzle nous entretient de l'anatomie et du fonctionnement de l'appareil génital mâle et femelle des Lépidoptères, avec des dessins à l'appui. Puis nous observons au binoculaire de nombreuses préparations.

M. Künzle nous rend attentifs sur les importants dégâts causés dans certains pâturages des Vosges par la chenille du *Charaxes graminis* L. Les régions les plus atteintes sont le Rossberg et le Kahlewasen.

Avant de présenter les préparations d'armures génitales mises à notre disposition par notre éminent collègue le Dr. Lortz, M. Künzle nous entretient de l'anatomie et du fonctionnement de l'appareil génital mâle et femelle des Lépidoptères, avec des dessins à l'appui. Puis nous observons au binoculaire de nombreuses préparations.

M. Künzle nous rend attentifs sur les importants dégâts causés dans certains pâturages des Vosges par la chenille du *Charaxes graminis* L. Les régions les plus atteintes sont le Rossberg et le Kahlewasen.

Avant de présenter les préparations d'armures génitales mises à notre disposition par notre éminent collègue le Dr. Lortz, M. Künzle nous entretient de l'anatomie et du fonctionnement de l'appareil génital mâle et femelle des Lépidoptères, avec des dessins à l'appui. Puis nous observons au binoculaire de nombreuses préparations.

M. Künzle nous rend attentifs sur les importants dégâts causés dans certains pâturages des Vosges par la chenille du *Charaxes graminis* L. Les régions les plus atteintes sont le Rossberg et le Kahlewasen.

Avant de présenter les préparations d'armures génitales mises à notre disposition par notre éminent collègue le Dr. Lortz, M. Künzle nous entretient de l'anatomie et du fonctionnement de l'appareil génital mâle et femelle des Lépidoptères, avec des dessins à l'appui. Puis nous observons au binoculaire de nombreuses préparations.

M. Künzle nous rend attentifs sur les importants dégâts causés dans certains pâturages des Vosges par la chenille du *Charaxes graminis* L. Les régions les plus atteintes sont le Rossberg et le Kahlewasen.

Avant de présenter les préparations d'armures génitales mises à notre disposition par notre éminent collègue le Dr. Lortz, M. Künzle nous entretient de l'anatomie et du fonctionnement de l'appareil génital mâle et femelle des Lépidoptères, avec des dessins à l'appui. Puis nous observons au binoculaire de nombreuses préparations.

M. Künzle nous rend attentifs sur les importants dégâts causés dans certains pâturages des Vosges par la chenille du *Charaxes graminis* L. Les régions les plus atteintes sont le Rossberg et le Kahlewasen.

Avant de présenter les préparations d'armures génitales mises à notre disposition par notre éminent collègue le Dr. Lortz, M. Künzle nous entretient de l'anatomie et du fonctionnement de l'appareil génital mâle et femelle des Lépidoptères, avec des dessins à l'appui. Puis nous observons au binoculaire de nombreuses préparations.

M. Künzle nous rend attentifs sur les importants dégâts causés dans certains pâturages des Vosges par la chenille du *Charaxes graminis* L. Les régions les plus atteintes sont le Rossberg et le Kahlewasen.

Avant de présenter les préparations d'armures génitales mises à notre disposition par notre éminent collègue le Dr. Lortz, M. Künzle nous entretient de l'anatomie et du fonctionnement de l'appareil génital mâle et femelle des Lépidoptères, avec des dessins à l'appui. Puis nous observons au binoculaire de nombreuses préparations.

raisons d'armures génitales mâles et femelles de différents Sphingidae : *Mameba queucus* Schiff., *Smerinthus ocellata* L., *Amorpha populi* L., *Mimata thia* L., *Sphinx ligustri* L., *Hylotus pinastri* L., *Celerio euphorbiae* L., *nicaea* Prun. Nous avons vu tout l'intérêt que présente l'étude des armures génitales des insectes. Nous avons noté la modification de l'armure génitale mâle de *Cel. euphorbiae* L. né de chenille sans corne. Nous avons également observé d'intéressantes coupes microscopiques de chenilles du *Cel. euphorbiae* L. nées sans corne et constaté qu'il n'y avait aucune trace de corne. Enfin les collègues ont examiné des coupes microscopiques des gonades mâles de la chrysalide du *Cel. euphorbiae* L. Les collègues tiennent à remercier chaleureusement ici le Dr. Lortz d'avoir mis à leur disposition ces préparations d'un grand intérêt scientifique.

Nous sommes heureux d'annoncer à nos collègues que d'autres présentations du Dr. Lortz seront présentées à la séance du 13 octobre 1956. Nous verrons des armures génitales mâles et femelles de *typ. podalirius* L., *Ch. fastus* L., *brevicauda* et *Lasioleuca queucus* L.

Séance levée à 23 h 15.

E. K.

Articles parus dans le Bulletin de la Société Entomologique de Bâle

Mars 1956, H. Beuret, Studien über den Formenkreis *Lysandra cordon-hispana-albicans*. Ein Beitrag zum Problem der Artbildung.

Avril 1956, F. Benz, Die Frage der Artsgrenze von *Acherontia atropos* L. und anderen Wander-Sphinxiden in Mitteleuropa.

Mai 1956, F. Benz, Zur Generatio-nenzahl von *Collas phicomone* Esp. Ein Zuchtbeobachtung.

Juni 1956, H. Beuret, Studien über den Formenkreis *Lysandra cordon-hispana-albicans*. Ein Beitrag zum Problem der Artbildung.

ANNONCES

M. Denis Sella, 18, promenade de la Sella, Metz-Queuleu offre :

50 *Ceratocephala* et *Adeloccephala* d'Amérique du Sud, avec raretés : 5.500 fr.

60 *Saturniidae* d'Asie orient. et Amérique du Sud, avec *Brahma*, *Rotischia*, *Atia tucumana*, *arcusa* etc. : 7.500 fr.

35 *Sphingidae* Amérique du Sud, avec de très bonnes espèces (*Protolipsa*, *Incisa*, *abiplaga*, *parce*, *gamasus* etc. : 4.500 fr.

Charaxes et autres de Côte de l'Or et Indes Or. sur demande.

Coléoptères exotiques disponibles.

Les réunions ont lieu chaque deuxième samedi du mois au Café-Restaurant « Terminus » - 22, rue de l'Espérance - C. 10.

Collections : France 300 fr - Etranger 400 fr - C. 10.

Société Entomologique de Mulhouse, 35.