

1^{er} JUIN 1952

Président (h. FISCHER, 52, rue de Verdun)

le de la ssp. incerti. Je ne possède pas de description des autres sous-espèces.
Un a peu de renseignements sur les aberrations individuelles de cette espèce.
Ab. immaculata Vrtj.: Taches des ailes antérieures absentes, y compris la tache apicale.
Ab. evanescens Vrtj.: Taches des ailes antérieures très effacées.

la femelle.
Ab. magnimaculata Rost.: Taches noires encore plus intenses et plus développées chez la femelle.
Ab. anictera Turati.: Ailes d'un jaune soutire chez la femelle.
Ab. detersa Vrtj.: Ailes irrégulièrement nuancées de jaune en dessus; forme dépourvue de dessins.

(à suivre)

Etude de la phénologie des Lépidoptères d'Europe

Vois de papillons près de Mulhouse d'avril à mai 1952

M. Fischer: observe les 29, 30 avril et 1^{er} mai, les premiers *P. po-dalirius* L.

Lors d'une tournée dans la forêt du Nonnenbruch, le 1^{er} mai, est capturé un exemplaire de *P. machaon* L.; le vol de *J. L.*, *Pieris napi* L. et *A. cardamines* L. est encore normal, tandis que *G. rhamni* L. n'est plus trouvé qu'en de rares exemplaires complètement défranchis. Partout vol intense de *Pyr. cardui* L. De cette espèce ne sont capturées que des femelles butinant sur les fleurs. Aucun signe de migration.

M. Fasnacht: observe le 30 avril le premier exemplaire de *Pyr. atalanta* L.

M. Burglin: rencontre le 2 mai vers 18 h sur une route dégagée et longue de plusieurs kilomètres, l'espèce *Pyr. cardui* L. en nombre considérable. Tous les papillons posés sur la route pour profiter des derniers rayons du soleil couchant, se lèvent au passage, volent en direction du nord-est et se posent de nouveau sur la route.

M. Kummerer: constate le 10 mai vers 16 h 30 la présence de *Pyr. cardui* L. en grand nombre sur la route de Thann. Aucun signe de migration n'est observé.

M. Hohl: le 30 avril vol de plusieurs spécimens de *P. machaon* L. au sud-est de Mulhouse. Debut mal vol dispersé de *Pyr. cardui* L.

Compte-Rendu de la réunion mensuelle du 10 mai 1952

C'est à 20 h 30 que le Président, en présence d'une assistance composée uniquement d'entomologistes mulhousiens, procède à l'ouverture de la séance et à la distribution de notre périodique mensuel.

M. Fischer informe les collègues que l'Entomologie en général et notre société en particulier, viennent de perdre un de leurs meilleurs collaborateurs et membre en la personne du Dr R. Loebliger de Zurich. On se lève en observant une minute de silence en sa mémoire.

La 38e circulaire sur les migrations des lépidoptères et dernier travail du défunt dans ses recherches et études dans ce domaine est présentée à l'assemblée de pair avec les autres revues et bulletins nous parvenant régulièrement.

La «Frankische Verlagshandlung W. Keller» de Stuttgart, nous transmet le premier tome d'un important ouvrage intitulé: «Die Schmetterlinge Mitteleuropas». Tous ces papillons représentés sont la reproduction d'aquarelles dont l'exécution est absolument conforme à la réalité. Le courtier entre est soumis à une rapide discussion. Finalement M. Fischer fait un court exposé sur l'évolution de *Pieris napi* L. Fin de la séance à 22 heures.

F. HOHL

Spuler, 4 volumes, papillons et chenilles, à vendre 10.000 fr. S'adresser à M. Ch. Groskopf, 12, quai du Fosse - Mulhouse.

Etude sur les genitalia de quelques Coleophoridae X

par S. TOLL

(avec 60 figures, planches I à VI)

Nouvelles espèces de Coleophora d'Afrique du Nord, Asie-Mineure, Syrie, Palestine, Liban et Iran

(Suite)

Anatolie, Aksehehir. Le mâle est inconnu. Le type se trouve au Muséum d'histoire naturelle de Vienne.

Sous le rapport des genitalia, l'espèce est très voisine de *C. agriatella* Rbl. Cette dernière est notablement plus grande (envergure 26 mm). La première section armée de dépines du *ductus bursae* est trois fois plus longue que l'*intrifidus vaginalis*. Les deux espèces appartiennent au 18e groupe.

C. praeposita spec. nov.

Tête, thorax et article basal des antennes blanc-jaunâtre. *Flagellum* blanc, le pinceau de poils de l'article basal jaune d'ocre. Palpes blancs jaune d'ocre clair à base; article médian, de 3/4 du diamètre de l'œil; article terminal de moitié plus court que l'article médian. *Antennes antérieures* jaune d'ocre clair, un peu brunes sous la strie costale. *Stries* blanches d'un brillant soyeux. La strie costale débute, sous forme de tache, à 1/3 de la longueur de l'aile. Elle n'est pas appliquée tout contre la costa, mais en est un peu distante, et ne vient la toucher qu'à la naissance des franges. Le bord costal est finement nuancé de brun. La ligne médiane est courte, large, pointue aux deux extrémités, et n'atteint pas le bord de l'aile. La strie anale n'atteint pas non plus le bord externe. La strie

dorsale va jusqu'à la naissance des franges. Envergure 19 mm.

Appareil génital mâle

(Pl. 4, fig. 35)

Bord caudal du *sacculus* faiblement denté, angle dorsocaudal obtus; sous celui-ci, se trouve une petite dent sur le corps du *sacculus*. *Valve* élargie du côté caudal. *Valvula* bien individualisée. Je n'ai pas remarqué de *cornuti*.

Maroc, Gr. Atlas, 2.200 à 2.900 m, en juillet. Zerny leg. La femelle est inconnue. Le type se trouve au Muséum d'histoire naturelle de Vienne le paratype dans ma collection.

Sous le rapport des genitalia, l'espèce est très voisine de *C. agriatella* Rbl., mais est notablement plus petite. Les valves sont plus petites, et moins élargies du côté distal.

C. dubiosa spec. nov.

Tête, thorax, palpes et antennes blancs. Article basal des antennes pourvu d'un pinceau de poils jaune d'œuf clair. Article médian des palpes, de 2/3 du diamètre de l'œil; article terminal, d'1/3 de la longueur de l'article médian. *Ailes antérieures* jaune d'œuf clair. *Stries* blanches, d'un brillant soyeux. La strie costale part d'une tache à 1/3 de la longueur de l'aile, puis se rétrécit brusquement et se perd dans les franges. La tache ou prend naissance la strie costale ne se trouve