

Compte rendu de la séance du 13 décembre 1958

Le président, M. Klinzig, ouvre la séance à 20 h 15 par la présentation des périodiques et par la lecture de la correspondance. Nous notons l'adhésion de nouveaux collègues suivants à qui nous souhaitons une cordiale bienvenue.

Professeur Dr Jan Roubal, U 2 batterie, Praha XVIII (Tchécoslovaquie).

M. Guy Culas, 45 bis, rue de Buffon, Paris (Ve).

(Moselle).

M. Massole, 65, rue de Douarnenez, Quimper (Finistère).

M. J. P. Thelot, 206, rue de la Paix, Equeurdreville (Manche).

Changement d'adresse :

M. L. Crépin, 2, rue J.-J. Rousseau, Colmar (Haut-Rhin).

M. Gabriel Maret, 5, square Hôtel de Ville, Ville la Grand (Haute-Savoie).

M. Louis Monzingue, 29, rue des Moutons, Haguenau (Bas-Rhin).

Divers : Les collègues ont constaté que cet automne *Cheimatobia brumata* L. était très nombreux. M. E. Denninger en a dénombré 57^c posés sur les vitrines sur une distance d'environ 150 m. Il est à noter que les spécimens vus cette année sont d'assez petite taille. Les grands exemplaires sont rares.

Causerie : M. Lerdung continuant ses causeries sur la détermination et l'étude des Lépidoptères nous entretenait sur le groupe des Rhopalocères.

La séance est levée à 22 h 15.

ANNONCE

M. Beaulaton, Ecole maternelle Barrière d'Issotre à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) recherche *chrysalides de Lépidoptères* en diapause pour étude physiologique, de préférence de grande taille (Saturniides, Sphinx ites...)

A vendre : *Setix, Macrodépidoptères*, 4 vol. en français. S'adresser à M. E. Gonthier, 49, rue Charles Dubois, Amiens (Somme).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

qui aura lieu le 25 janvier 1959, à 14 h 30, au restaurant « Terminus », rue de l'Espérance, à Mulhouse.

ORDRE DU JOUR :

- 1) Ouverture de l'Assemblée et allocution du président ;
- 2) Rapport d'activité de l'année par le secrétaire ;
- 3) Rapport financier
- 4) Rapport du bibliothécaire ;
- 5) Décharge de l'ancien comité ;
- 6) Election du nouveau comité ;
- 7) Divers ;
- 8) Reportage photographique avec projection par M. Lerdung.

Nous informons nos membres qu'un échange d'insectes aura lieu à l'issue de la séance. Nos membres sont donc invités à apporter des Insectes en nombre.

Nos membres et amis voudront bien nous honorer de leur présence.

La réunion du mois de février est supprimée.

LE COMITÉ.

BULLETIN



de la Société Entomologique de Mulhouse

Publication mensuelle

JANVIER 1959

Président : E. KLINZIG
35, place de la Réunion

Etude sur les genitalia

de quelques Coleophoridae XIII (Lepidoptera)

Description de trois nouvelles espèces de l'Iran

par le Dr. S. TOLL

Coleophora hatamae spec. nova.

Tête (fig. 1) et thorax ainsi que l'article basal des antennes blanc-grisâtre; flagellum blanc dans sa partie basale annelé indistinctement de gris et gris sur sa partie externe. Palpes couvertes d'écaillures quelque peu grossièrement, sur la face interne blanchâtres, sur la face externe gris-clair, articles intermédiaire et terminal égaux au diamètre des yeux, touffe terminale de l'article intermédiaire, courte.

Alles antérieures (fig. 2) d'un blanc grisâtre mélangé de gris, nervures à peine saupoudrées de gris. Seule la nervure-radiale est plus largement couverte d'écaillures grises. Champ dorsal (surtout enure le bord anal (= dorsum) de l'aile et la nervure anale) gris jusqu'à la nervure anale. Franges sur la cosse grisâtres, autour de l'apex et sur le bord gris-clair, à leur base se trouvent quelques écaillures blanchâtres. Envergure 14 mm.

La bande transversale du système sclérifié de renforcement sur le premier tergite (fig. 3) avec un court pli au milieu du bord proximal (= antérieur) qui se dessine quelque peu indistinctement sur les côtés. Bord distal (= postérieur) courbé en angle droit avec un large pli fortement aminci au milieu. Disques des tergites de la troisième paire, 5 fois, ceux de la quatrième paire 5 fois et demi, et ceux de la cinquième paire 6 fois plus longs que larges.

Appareil génital mâle (fig. 4). Valve courte et large. Valvula indistinctement détachée avec de longues soies raides dirigées vers l'intérieur. Sacculus pourvu d'une dent dirigée en sens dorsal, à l'angle dorso-caudal. L'angle ventro-caudal du sacculus est arrondi. L'aedæus est plus mince vers sa terminaison caudale. Cœcum modestement long. Des cornuti n'ont pas été trouvés.

Holotype (mâle), Schiraz 25. IX. 1957, se trouve dans ma collection. La femelle est inconnue.

Cette nouvelle espèce s'apparente le mieux au groupe *conyzæ* Zell., et se place au point de vue génital le plus près de *C. nigrit-*