

NOTES ADDITIONNELLES SUR LES NÉVROPTÈRES DES VOSGES

(Suite)

Par Robert MAC-LACHLAN.

Comme suite à mes premières notes additionnelles (Voir *Revue d'Entomologie*, janvier 1885), je puis ajouter huit espèces, faisant partie des résultats des chasses de M. Cuny-Gaudier en 1885, et il reste encore quelques petites Perlides et Éphémères à déterminer.

M. Cuny, de Gérardmer, a eu la bonté de m'envoyer deux boîtes de Névroptères à examiner, et pendant les mois d'automne, j'ai encore eu le concours de mon ami, M. le Dr Puton, de Remiremont, qui a continué par la poste les envois de Trichoptères de cette saison que j'ai reçus presque vivants. En 1885, M. Puton n'a pas trouvé d'espèces nouvelles pour le pays, mais néanmoins il a retrouvé des types fort intéressants.

Je crois convenable de commencer ces notes par des observations sur quelques Trichoptères déjà connus du pays.

Halesus ligonifer Mac-Lach. — M. Puton a retrouvé cette jolie espèce en abondance pendant l'automne, sur la Moselle, à Remiremont. Elle habite également près de Gérardmer; car elle existe en assez grand nombre dans les boîtes de M. Cuny, de plusieurs localités du district où elle paraît principalement au mois de septembre. Excepté la ♀, type provenant d'une localité assez incertaine, l'espèce ne m'est connue que des Vosges.

Anomalopteryx Chauviniana Stein. — (Voir la *Revue*, l. c.). M. Cuny a pu retrouver les deux sexes de cette très-singulière espèce et en grande quantité. Il m'écrit que le 13 septembre 1885, il en prit une famille sur les herbages au bord de la Jamagne, en descendant à Kichompré; il a reconnu la ♀ d'après les indications que j'ai données dans la *Revue*. Celle-ci vole très-bien; mais le ♂ ne s'envole pas, il ne fait que tournoyer sur ses grandes jambes en s'aidant de ses ailes étroites.

Chaetopteryx obscurata Mac-Lach., et *Chaetopterygopsis Mac-Lachlani* Stein. — Parmi une masse énorme de *Chaetopteryx villosa*, envoyée par M. Puton, j'ai pu retrouver ces deux espèces, mais en petit nombre, ce qui m'a surpris. Aussi il me semble probable que la Moselle (au moins à Remiremont), n'est pas l'habitat des larves de ces deux espèces et que le peu d'individus qu'on y trouve vient de

larves portées par le courant ou par les inondations des ruisseaux des montagnes.

Voici maintenant les huit espèces nouvelles pour le pays :

TRICHOPTÈRES.

FAM. PHRYGANEIDÆ.

Agrypnia Payetana Curt. — Une ♀, de Luxeuil, 1^{er} juin; espèce propre aux marais et aux bords des lacs.

FAM. LIMNOPHILIDÆ.

Limnophilus nigriceps Zett. — Quelques individus, du lac de Longemer, au mois de novembre; espèce automnale.

Halesus auricollis Pict. — Un seul ♂, du Saut-des-Cuves, le 21 septembre; espèce automnale (comme le genre presque entier), qui ordinairement vole en abondance où elle se trouve.

* *Drusus chrysotus* Rambur. — Un ♂ en mauvais état, du Hohneck, au mois de juillet. Espèce propre aux hautes Alpes de l'Europe centrale; c'est une addition bien intéressante pour la faune des Vosges.

FAM. HYDROPSYCHIDÆ.

Cyrrhus flavidus Mac-Lach. — Un ♂, sans indication de localité.

FAM. RHYACOPHILIDÆ.

* *Rhyacophila evoluta* Mac-Lach. — Un ♂ bien caractérisé, de Kichompré, le 13 septembre. Espèce très-intéressante pour la faune, trouvée d'abord par mon ami, M. Eaton, sur les montagnes du Cantal, près Le Lioran. Le 28 juillet 1885, j'en pris un seul ♂ près du petit lac, sur le Feldberg, dans la Forêt-Noire de Bade, de sorte que les Vosges sont une localité intermédiaire.

PLANIPENNES.

Chrysopa ventralis Curt. — Un individu, sans indication de localité.

PSEUDO-NÉVROPTÈRES.

Psocus longicornis Latr. — Martimprey, le 20 octobre; plusieurs individus.
