

## **Valeria jaspidea de Villers (1789) : espèce nouvelle pour la Lorraine.**

( *Lepidoptera Noctuidae Cuculliinae*, Catalogue Léon Lhomme : 580 ; Catalogue Patrice Léraut 2ième ed. : 4535)

Michel Martin

Un mâle récolté le 8 avril 1996, rue du Fort à Villers-le-Sec (54), en examinant les alentours des lampes d'éclairage public du village vers 6h du matin.

Un mâle récolté le 26 avril 1996 au même endroit, dans les mêmes conditions.

D'après FORSTER et WOLFART (1980), cette espèce habite l'Europe moyenne et nordique, jusqu'en moyenne montagne. D'après KOCH (1984), elle se trouve en Allemagne du Sud-Ouest, mais aussi en Thuringe, Nassau et dans le Naketal.

Selon LHOMME (1923-1935), elle se trouve partout en France, sauf dans la partie septentrionale. Il énumère 24 départements où l'espèce a été trouvée, les plus nordiques étant le Maine-et-Loire, la Seine-et-Marne, l'Aube, le Bas-Rhin (Saverne, Bischberg). Elle est absente d'Angleterre et de Belgique.

On remarquera que cette capture a eu lieu en bordure de la Vallée de la Moselle, voie de migration bien connue, qui offre sur ses rives des conditions microclimatiques diverses, permettant à bien des espèces de se maintenir dans notre région.

On pourra ironiser sur cette découverte au Fort de Villers-le-Sec avec ses profondes constructions, ses vastes couloirs à ciel ouvert, recouverts par ailleurs de prunelliers, la plante nourricière élective, pouvant offrir une protection

écologique transitoire : le gîte et le couvert !!

Il faut cependant remarquer qu'en Allemagne, l'espèce remonte loin au Nord.

Il s'agit d'une espèce qui, comme beaucoup d'insectes en France, est commune dans le Midi, plus rare dans le Nord. Par exemple *Lamprosticta culta* D. & S., largement répandue dans le Sud de la France, capturée à Saverne (in Berce) et Bischberg (M. Busch) dans le Bas-Rhin, dans la Marne (moi-même) ainsi qu'en Belgique : espèce " surtout méridionale " dit Léon Lhomme ou *Mesogona acetosellae* D. & S., capturée dans le Haut-Rhin, en Seine-et-Marne, à Toul par M. Abel Lieger, ainsi qu'en Belgique, cette espèce appartient aussi à la faune de l'Europe chaude.

Je pense qu'il en est de même pour *Valeria jaspidea*.



### **Bibliographie :**

- FORSTER et WOLFART, 1980 Die Schmetterlinge Mitteleuropas, T3, Frankh'sche Verlagshandlung.
- KOCH A., 1984 Wir bestimmen Schmetterlinge, Verlag J. Neumann-Neudamm.
- LHOMME L., 1923-1935 Catalogue des Lépidoptères de France, T1, 1923-1935.

Note humoristique (?) du Rédac' : n'est - il pas normal qu'une espèce décrite par Villers, se retrouve à Villers-le-Sec ? Bon, d'accord, cela aurait été meilleur à Villers-les-Nancy, mais promis, je ne recommencerais plus ce genre d'astuce vaseuse.....