

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE QUELQUES SATYRINES
DANS LE DÉPARTEMENT DE L'AUBE
'LEP. NYMPHALIDAE SATYRINAE'

par Roger MÉTAYE

JOURDHEUILLE (1883 : 24-27) a cité 22 espèces de Satyrinae pour le département de l'Aube. Mis à part deux espèces : H. statilius et B. circe qui n'ont été trouvées que par DUPIN, à Ervy-le-Châtel, il y a plus d'un siècle, les vingt autres ne représentent donc pas même le tiers de la faune française.

Cette faible proportion risque de baisser encore du fait de la quasi disparition de cinq espèces, et ce, depuis fort longtemps déjà pour certaines : H. alcyone (P. THIAUCOURT leg., 1965), C. briseis (P. VIETTE leg., 1941), M. dryas (G. DENIZE leg., 1974), C. hero (P. THIAUCOURT leg., 1961) et L. achine (G. DENIZE leg., 1974).

La présence des diverses espèces auboises, pour la période 1978-1985, et en prenant la tétrade pour unité de situation des stations, s'établit comme suit :

3005. <i>Melanargia galathea</i>	241	3035. <i>Erebia aethiops</i>	33
3009. <i>Hipparchia fagi</i>	8	3037. <i>Erebia medusa</i>	18
3012. <i>Hipparchia semele</i>	4	3057. <i>Maniola jurtina</i>	232
3023. <i>Brintesia circe</i> ?	2	3060. <i>Aphantopus hyperantus</i>	93
3024. <i>Arethusana arethusa</i>	2	3061. <i>Pyronia tithonus</i>	181

(À suivre)

307, rue du Fbg-Croncels, 10000 Troyes

o litt. (lieu de récolte); ⊕ id. (localité); ● mph. leucomelas





