

CARCHARODUS LAVATHERAE Esper
DANS LE DÉPARTEMENT DE L'AUBE ?
'LEP. HESPERIIDAE'

par Roger MÉTAYE

Le Musée d'Histoire naturelle de Troyes possède une collection de Lépidoptères du département de l'Aube. Cette oeuvre, commencée par le Conservateur Jules RAY, fut achevée par Camille JOURDHEUILLE, il y a plus d'un siècle !

En procédant au reclassement de cette collection, qui a beaucoup souffert, j'ai eu la surprise de trouver un exemplaire - ou plutôt un demi-exemplaire - de Carcharodus lavatherae Esper. En effet, il ne reste que la partie antérieure du papillon; l'abdomen et les ailes postérieures ont disparu. L'exemplaire en question ne porte évidemment aucune indication de localité, ni de date, mais le fait de figurer dans cette collection implique qu'il a été trouvé dans le département de l'Aube. D'autre part, il a été capturé à une date postérieure aux publications de C. JOURDHEUILLE (1883, 1889).

Cette espèce, qui porte le n° 2899 dans la Liste systématique et synonymique de P. LERAUT (1980), est donc à ajouter à la liste des Rhopalocères de l'Aube, d'où le nouveau total de 113 espèces.

Mais où donc faudrait-il rechercher C. lavatherae dans l'Aube ?

D'après la carte 354 figurant dans L. HIGGINS & N. RILEY (1975 : 405), l'espèce pourrait se trouver dans le S.E. du département; elle y serait à la limite septentrionale de son aire de répartition.

Pour l'habitat, I. NOVÁK & F. SEVERA, traduit par G. Chr. LUQUET (1983 : 126) indiquent : " Espèce rare et localisée fréquentant les pentes ensoleillées et richement fleuries sur sous-sol calcaire de l'étage collinéen ".

L'espèce serait donc bien à rechercher dans la partie Jurassique du département, notamment dans le canton de Mussy-sur-Seine et plus spécialement dans celui des Riceys.

Pour faciliter les recherches, il est bon de préciser que le papillon vole de juin à août et que la chenille vit sur une Labiée : l'Épiaire des Alpes (Stachys alpina) (NOVÁK, SEVERA & LUQUET, 1983 : 126) ou sur l'Épiaire droite (Stachys recta) (LHOMME, 1923 : 106). Ces deux plantes existent dans l'Aube, et M. René PRIN, botaniste, que je remercie vivement, m'a indiqué quelques localités pour S. alpina : les Riceys (b. d'Herbue), Plaines-St-Lange, Gyé-sur-Seine, Neuville-sur-Seine (b. de Thouan); S. recta est largement répandue.

RÉFÉRENCES

- HIGGINS (L.G.) & RILEY (N.D.), trad. ROUGEOT (P.-C.), 1975. - Guide des Papillons d'Europe. - Delachaux & Niestlé, Paris. 421 p.
LHOMME (L.), 1923-1935. - Catalogue des Lépidoptères de France et de Belgique. I. Macrolépidoptères. - Lhomme, le Carriol. 800 p.
NOVÁK (I.) & SEVERA (F.), trad. LUQUET (G.C.), 1983. - Le multigui-de nature des Papillons d'Europe. - Bordas, Paris. 352 p.

307, rue du Fbg-Croncels, 10000 Troyes