

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE QUELQUES LYCÉNIDES
DANS LE DÉPARTEMENT DE L'AUBE (suite)
'LEP. LYCAENIDAE s.l.'

par Roger MÉTAYE

Parmi les Théclas étudiés précédemment, Satyrium spini, qui n'a pas été retrouvé, a été cité comme AR, Clairvaux, par JOURDHEUILLE (1883 : 16).


Chez les Cuivrés, deux espèces ne figurent pas dans le Catalogue Jourdheuille : Lycaena alciphron, capturé aux Riceys (DENIZE, 1978)* et L. hippothoe, trouvé à Pâlis (MÉTIVIER, 1980)**.

Pour la période 1978-1985, la présence des espèces actuelles, exprimée en tétrades, est la suivante :

3096. <u>Lycaena</u> <u>dispar</u>	18	3107. <u>Celastrina</u> <u>argiolus</u>	32
3098. <u>Lycaena</u> <u>tityrus</u>	18	3108. <u>Pseudophilotes</u> <u>baton</u>	1
3103. <u>Cupido</u> <u>minimus</u>	34	3110. <u>Glaucopsyche</u> <u>alexis</u>	17
3105. <u>Everes</u> <u>argiades</u>	1		

(À suivre)

307, rue du Fbg-Croncels, 10000 Troyes



* DENIZE (G.), 1978. - Heodes alciphron Rott. et Melanargia galathea f. leucomelas Esp. dans l'Aube. - Alexanor, 10 (8) : 366.

** MÉTIVIER (G.), 1980. - Captures intéressantes 'Lep. Rhopalocera'. - Bull. du Gr. ent. aubois, 1 (1) : 9.

