

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE QUELQUES LYCÉNIDES
DANS LE DÉPARTEMENT DE L'AUBE (suite et fin)
'LEP. LYCAENIDAE s.l.'

par Roger MÉTAYE

Dans la première partie de ce travail sur la répartition des Lycénides (Bull. d'Ent. champen., 4 (2), 1986 : 65), j'ai indiqué que Maculinea teleius et Plebicula dorylas se trouveraient, dans le département de l'Aube, nettement en dehors de leur aire de répartition. D'ailleurs, JOURDHEUILLE (1883 : 18-19) les a donnés tous deux comme T.R., le premier avec doute quant à l'identification faite par DUPIN, d'Ervy, le second pour un seul exemplaire capturé aux Riceys.

En ce qui concerne les Lycaeides idas et argyrognomon, deux espèces pour lesquelles les confusions sont toujours possibles, je préfère m'abstenir, pour le moment, d'en donner des cartes de répartition.

Pour la période 1978-1986, la présence des espèces actuelles, exprimée en tétrades, est la suivante :

3112. <i>Maculinea alcon</i>	1	3120. <i>Aricia agestis</i>	17
3113. <i>Maculinea arion</i>	7	3128. <i>Cyaniris semiargus</i>	9
3117. <i>Plebejus argus</i>	2	3136. <i>Lysandra coridon</i>	128
3118. <i>Lycaeides idas</i>	?	3138. <i>Lysandra bellargus</i>	53
3119. <i>L. argyrognomon</i>	ca 32	3140. <i>Polyommatus icarus</i>	228

307, rue du Fbg-Croncels, 10000 Troyes





