

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE QUELQUES SATYRINES
DANS LE DÉPARTEMENT DE L'AUBE (suite)
'LEP. NYMPHALIDAE SATYRINAE'

par Roger MÉTAYE

Des quatre *Coenonympha* se trouvant dans l'Aube, seul *C. hero* a disparu, et ce, depuis près d'un quart de siècle. *C. pamphilus* et *C. arcania* sont encore assez largement répandus, mais *C. glycerion* ne se rencontre que rarement et paraît se localiser dans le sud-est du département.

Parmi les Satyrines suivants, *Pararge aegeria* et *Lasiommata megera* sont bien représentés et se rencontrent fréquemment, mais, en revanche, *L. maera* semble se raréfier depuis 1981.

La présence de ces diverses espèces auboises, pour la période 1978-1985, en prenant la tétrade pour unité de situation des stations, s'établit comme suit :

3065. <i>Coenonympha pamphilus</i>	181	3074. <i>Pararge aegeria</i>	131
3072. <i>Coenonympha arcania</i>	72	3075. <i>Lasiommata megera</i>	116
3073. <i>Coenonympha glycerion</i>	13	3076. <i>Lasiommata maera</i>	22

En conclusion, des vingt-deux espèces de Satyrines citées par C. JOURDHEUILLE (1883 : 24-27), il n'y a guère, actuellement, que 15 espèces permanentes parmi lesquelles *H. fagi* et *H. semele* sont signalés de plus en plus fréquemment depuis 1983.

307, rue du Fbg-Croncels, 10000 Troyes





