

al., 1985), et qui m'est imputable; à la place de :

4391. Eucarta amethystina Hübner (687)

CARUEL : Rilly (DEMAISON, Reims, 1907 : 146), Mâco. - VI.

Il faut lire :

4391. Eucarta amethystina Hübner (687)

CARUEL : Vrilly (DEMAISON, Reims, 1907 : 146), Mâco. - VI.

Vrilly n'est pas le nom d'une commune, mais celui d'un lieu-dit situé sur la commune de Cormontreuil (726 2471), aux abords de Reims. On remarquera que les trois lieux de capture de E. amethystina : Vrilly (commune de Cormontreuil), Mâco (commune de Merfy) et Trigny, sont tous situés dans les marais de la Vesle.

RÉFÉRENCE

DEMANGE (M.), DENIZE (G.) et LAMBERT (C.), 1985. - Lépidoptères Noctuidae du département de la Marne. Les données du Fichier Caruel et observations complémentaires (suite). - Bull. d'Ent. champen., 3 (7), 1985 : 239-250 'E. amethystina, p. 242'.

11, cours Langlet, 51100 Reims

UNE REMARQUABLE ABERRATION DE SEMIOTHISA CLATHRATA Linné

'LEP. GEOMETRIDAE

par Roger MÉTAYE

Dans la commune de Bourguignons (Aube), des landes s'étendent sur une formation calcaire du Barrois (Portlandien - j6). Elles sont d'un intérêt entomologique certain (1), et c'est au cours d'une prospection de routine que j'y ai capturé une curieuse aberration de Semiothisa clathrata Linné (pl. 13, fig. 10 et 11).

Cette forme est tellement remarquable que je propose de la nommer fasciata f. nov.

Aux ailes antérieures et postérieures, l'espace compris entre les lignes antémédiane et médiane est entièrement rempli de brun. En revanche, la ligne postmédiane n'est représentée que par un léger semis d'écailles brunes.

Dessous des quatre ailes sensiblement comme en dessus; toutefois, aux ailes postérieures, un faible semis d'écailles claires apparaît dans la bande brune.

Sur les deux faces des ailes, le graphisme tranche sur un fond d'un blanc presque pur.

Type : 1 ♂, Bourguignons, val de Fôl (749 2350), 150 m, 23-V-1986 (R. MÉTAYE leg. et in coll.).

307, rue du Fbg-Croncels, 10000 Troyes

1. Cf. Bull. d'Ent. champen., 4 (2), 1986 : 51-56, pl. 7, fig. 2.