

CONTRIBUTION À L'ÉTUDE DES LÉPIDOPTÈRES
HÉTÉROCÈRES DE L'AUBE
'HEPIALIDAE, COSSIDAE, ATTACIDAE et SPHINGIDAE'
par Gérard MÉTIVIER

La classification et la nomenclature correspondent à celles de la Liste systématique et synonymique de Leraut (1980) avec rappel, entre parenthèses, du numéro d'ordre.

HEPIALIDAE

Hepialus humuli Linné (17). - Nogent-sur-Seine, 2 ♀♀ capturées pour la première fois les 23 et 24 juin 1981, puis 1 ♂ le 30 mai 1982, au crépuscule, avec une lampe à vapeur de mercure. JOURDHEUILLE (1883), dans son Catalogue des Lépidoptères de l'Aube, n'a pas mentionné son existence dans le département. Toutefois, il pensait qu'il serait possible, un jour ou l'autre, de la rencontrer aux Riceys où, à cette époque, des plantations de Houblon avaient été créées*.

Triodia sylvina Linné (18). - Nogent-sur-Seine, fin août. Tous les ans, quelques exemplaires.

Phymatopus hecta Linné (19). - Nogent-sur-Seine. Assez commun, au début juin.

Korscheltellus lupulinus Linné (20). - Nogent-sur-Seine. Très commun; 1 ♂ le 15 mai 1982, 1 ♀ le 22 mai 1982.

COSSIDAE

Zeuzera pyrina Linné (208). - Nogent-sur-Seine. Un seul exemplaire capturé le 1er août 1981.

Cossus cossus Linné (209). - Je n'ai jamais rencontré cette espèce à Nogent-sur-Seine. Pourtant, JOURDHEUILLE la présentait comme étant commune dans tout le département. Je ne désespère donc pas de la rencontrer**.

ATTACIDAE

Saturnia pyri Denis & Schiffermüller (3172). - Pâlis, 2 exemplaires en 1981 dont un ex larva.

Eudia pavonia Linné (3173). - Pâlis. Presque tous les ans; 1 ♀ le 8 mai 1982.

Agria tau Linné (3175). - Maraye-en-Othe. Très fréquent en bordure de la forêt où le ♂ vole de jour.

NDLR. - * L'espèce a été signalée récemment de l'Aube par VIETTE (1981) (Cf. Bull. d'Ent. champen., 2 (1), 1982 : 34).

** Un exemplaire ex larva de cette espèce a été obtenu par P. LEBLANC, en mars 1982. La chenille avait été récoltée à Vendeuvre-sur-Barse, en décembre 1981.

SPHINGIDAE
Sphinginae

Agrius convolvuli Linné (3791). - Nogent-sur-Seine. Très fréquent, tous les ans.

Acherontia atropos Linné (3792). - Ce magnifique Sphinx m'a été signalé de St-Aubin, près de Nogent-sur-Seine, par M. MIZELLE. Le seul exemplaire que je possède a été capturé à St-Florentin, dans l'Yonne, en 1970.

Sphinx ligustri Linné (3793). - Nogent-sur-Seine. Plus rare que l'A. convolvuli; 2 ♂♂ les 29 et 30 mai 1982.

Hyloicus pinastri Linné (3794). - Pâlis, 1 ex. en 1978.

Mimas tiliae Linné (3796). - Nogent-sur-Seine. Tous les ans; 2 ♂♂ le 22 mai 1982. Espèce très facile à élever, à partir de chenilles récoltées sur Cerisier cultivé.

Smerinthus ocellata Linné (3797). - Pâlis, 1 ex. en 1978. - Nogent-sur-Seine, 1 ♀ le 13 juin 1982.

Laothoe populi Linné (3798). - Nogent-sur-Seine, 1 ♀ le 13 mai 1982, 2 ♂♂ le 1er juin 1982.

Macroglossinae

Hemaris tityus Linné (3799). - Pâlis. Très rare; 2 ex. en 1978.

Hemaris fuciformis Linné (3800). - Pâlis. Assez commun. - Nogent-sur-Seine. Rare, 1 ex. le 4 août 1981.

Macroglossum stellatarum Linné (3801). - Nogent-sur-Seine. Très commun en août et septembre, de jour, sur Budleia.

Deilephila elpenor Linné (3810). - Nogent-sur-Seine, 2 ♂♂ les 7 et 12 juin 1982.

Deilephila porcellus Linné (3811). - Nogent-sur-Seine, 7 juin 1982, 1 ♂, 1 ♀.

6, rue Anatole-France, 10400 Nogent-sur-Seine

NDLR. - Coordonnées des localités citées :

Maraye-en-Othe : 712 2352 - EP63

Nogent-sur-Seine : 686 2389 - EP37

Pâlis : 701 2366 - EP54

St-Aubin : 692 2387 - EP47

St-Florentin (Yonne) : 704 2334 - EP51

Vendeuvre-sur-Barse : 782 2362 - FP04

ERRATUM

Bulletin d'Entomologie champenoise, 2 (2), 1982 : 64, 2e ligne.

Au lieu de : 1:1000 000, lire : 1:100 000.