

NOTE SUR UN ÉLEVAGE D'EUDIA PAVONIA
'LEP. ATTACIDAE'

par Pierre PORCHERET

J'ai recueilli à St-Oulph, le 30 juillet 1979, une chenille d'Eudia pavonia qui traversait une petite route près du canal. Elle cherchait certainement un endroit propice pour la nymphose, car dès la nuit du 30 au 31, elle s'est tissé un cocon contre la paroi de l'aquarium dans lequel je l'avais placée. La chrysalide a passé l'hiver dehors, sous abri, et l'éclosion a eu lieu par un beau temps ensoleillé, vers le milieu de la journée du 3 mai 1980, soit au bout de 277 jours. Il s'agissait d'une femelle de grande taille (envergure : 80 mm) avec de très beaux ocelles; l'extrémité des ailes antérieures portait une tache rose et une tache lie de vin (fig. 1).

En 1980, j'ai trouvé à Méry-sur-Seine une autre chenille de la même espèce, le 4 août, et je l'ai nourrie de feuilles de Cerisier (fig. 2) jusqu'au 16 août, date de la nymphose (celle-ci peut donc varier sensiblement).

La chenille d'Eudia pavonia est très belle : elle est verte et se compose de 12 segments portant chacun des verrues blanches cerclées de noir.

J'ai obtenu un imago ♀ le 25 février 1981, cette fois en maintenant la chrysalide dans mon sous-sol.

Rue Maurice-Parez, 10170 Méry-sur-Seine

NDLR : Les deux figures de la planche 2 ont été obtenues à partir de diapositives Kodachrome.

St-Oulph 713 2392 - EP67

Méry-sur-Seine 714 2391 - EP67

Observez, notez et communiquez tout ce qui vous paraîtra intéressant; si, sur dix observations faites, une seule est inédite, elle éclipsera immédiatement les autres.

L. LHOMME




Fig. 1. - Eudia pavonia ♀, ex-larva, en mai 1980.




Fig. 2. - Chenille adulte d'Eudia pavonia sur une
feuille de Cerisier, en août 1980.

Photos P. PORCHERET