

Les *types* de la collection d'Hémiptères de l'abbé G. d'Antessant

Dr. Maurice Royer

Citer ce document / Cite this document :

Royer Maurice. Les *types* de la collection d'Hémiptères de l'abbé G. d'Antessant. In: Bulletin de la Société entomologique de France, volume 27 (17), 1922. pp. 268-269;

doi : <https://doi.org/10.3406/bsef.1922.27045>

https://www.persee.fr/doc/bsef_0037-928x_1922_num_27_17_27045

Fichier pdf généré le 10/11/2021

Les types de la collection d'Hémiptères de l'abbé G. d'Antessant

par le D^r Maurice ROYER.

La collection d'Hémiptères de l'abbé G. d'ANTESSANTY, que je possède actuellement, contient les *types* de trois espèces d'Hétéroptères.

Ce sont :

*Podops calligera** Horvath 1887, *Rev. d'Ent.*, VI, p. 253, fig., p. 254.

Un seul spécimen ♀, trouvé par l'abbé G. d'ANTESSANTY, à Villechétif (Aube), le 3 août 1879 > ma collection.

Cette espèce n'a jamais été retrouvée.

*Rhyparochromus mixtus** Horvath 1887, *Rev. d'Ent.*, VI, p. 254.

Un seul spécimen ♀, trouvé par l'abbé G. d'ANTESSANTY, à Pornic (Loire-Inférieure), sur une petite dune > ma collection.

La collection G. d'Antessant comprend d'autres spécimens de *Rhyparochromus mixtus* Horv. provenant de : Bucey (Aube), VIII, 1891; Reuves (Marne), VIII; Collioure (Pyrénées-Orientales).

J'en ai capturé un individu à Banyuls (P.-O.) en avril 1907.

L'espèce paraît manquer dans le nord de la France. Elle est indiquée par REY (*Rev. d'Ent.*, VII, [1888], p. 100) de Fréjus, Collioure, Lyon et Villié-Morgon (Rhône); par HORVATH (*Rev. d'Ent.*, VII, [1888], p. 257, de Brides (Savoie) et de Bérisal (Simplon); par AZAM (Prem. liste des Hémipt. des Basses-Alpes, Digne, 1893), de Saint-André; par C. MARCHAL (Prem. notes sur les Hémipt. de Saône-et-Loire, Autun 1898) du Creusot; et par PÉNEAU (Faune entom. armoricaine, Hémipt., I, 1905) de la forêt du Gâvre (Loire-Inférieure) en novembre.

*Thaumastopus noviburgensis** Antessant 1888, *Rev. d'Ent.*, VII, p. 383 (*Notochilus*).

Trois spécimens dont deux immatures trouvés par l'abbé G. d'ANTESSANTY à Bourgneuf (Loire-Inférieure), en septembre, sous une petite touffe de chêne vert > ma collection.

Cette espèce n'a jamais été retrouvée.

* * *

Une espèce et plusieurs variétés ont été décrites par l'abbé G. d'ANTESSANTY, mais elles étaient préoccupées.

Ce sont :

Henestaris geocoriceps Antessanty 1885, *Rev. d'Ent.*, IV, p. 112
= *Henestaris halophilus* Burmeister 1835, *Handb. Ent.*, II,
p. 292.

Les types de *H. geocoriceps* provenaient de la Loire-Inférieure : La Bernerie (D^r MARMOTTAN), Pornic (abbé DOMINIQUE), Le Pouliguen (WOULT), trouvés dans le sable des falaises du littoral.

L'espèce était nouvelle pour la faune française.

Eurygaster hottentota H.-S., var. *picta* Antessanty 1891, *Cat. Hémipt.-Hét. du dép. de l'Aube in Mém. Soc. acad. Aube*, LIV, [1890], p. 184; sep. p. 8 = *Eurygaster austriacus* Schrank var. *obliquus* Kolenati 1846, *Mel. Ent.* IV, p. 12, n° 132 (1).

Eurydema decoratum L. var. *Putonia* Antessanty 1891, *l. c.* p. 190; sep. p. 14 = *Strachia picta* H.-S. var. *cruentata* Puton 1881, *Syn. Hém. Hét.*, IV, p. 70 = *Eurydema festivum* Linné 1767 (PUTON, *in litteris!*).

Drymus sylvaticus Fab. var. *niger* Antessanty 1891, *l. c.* p. 205; sep. p. 29 = *Drymus sylvaticus* Fab. var. *picinus* Rey, 1888, *L'Échange*, n° 38, p. 4.

Armature génitale et squelette chitineux de l'organe copulateur chez les Hémiptères aquatiques

(deuxième note préliminaire) (1)

par Raymond POISSON.

1^o NAUCORIDAE.

Naucoris cimicoides L. — L'urite génital (10^e urite) est protégé ventralement par le huitième sternite abdominal qui l'enveloppe. Dans la partie antérieure et dorsale de l'urite se détache un prolongement (10^e tergite de certains auteurs) qui se termine au sommet par deux valves entre lesquelles s'ouvre l'anus; prolongement et valves constituent la région anale (fig. 1) (2). Cette région est très peu développée

(1) KOLENATI a écrit : var 132. *obliqua* Leach. Or tous les auteurs rapportent ce nom d'*obliqua* à KOLENATI. Il s'agit fort probablement d'un nom *in litteris*, car LEACH n'a jamais décrit d'*Eurygaster!*

(2) Cf. première note in *Bull. Soc. ent. Fr.* [1922], p. 171.

(3) Certains auteurs considèrent la région anale comme un urite (PEYTOUREAU, 1895).