

Verzeichnis im Frühjahr 1916 bei Sedan (Ardennen) beobachteter Heterocerer.

Von G. Warnecke, Altona (Elbe).

(Schluß.)

36. *Boarmia cinctaria* Schiff. Am 1. 5. ein Stück.
37. *Boarmia punctularia* Hb. Vom 1. 5. an im Garennewald an Stämmen sehr häufig.
38. *Fidonia limbaria* F. Am 4. 5. das erste ♂ im Garennewald, vom 13.—18. 5. häufig.
39. *Ematurga atomaria* L. Seit Ende 4. überall häufig, vom 13. 5. an die ♂♂ abgeflogen, am 18. 5. 1 frisch ♀, mehrfach vom 20. 5. an.
40. *Phasiane petrarica* Hb. 1 ♀ am 17. 5. im Garennewald, ein abgeflogenes ♀ 21. 5. bei Olly.
41. *Phasiane clathrata* L. Mit ab. *cancellaria* Hb. Vom 4. 5. an häufig im Garennewald.

V. Nola, Aretia — Hepialus.

1. *Nola confusalis* H. S. Am 2. und 3. 5. je 1 Exemplar im Garennewald.
2. *Spilosoma mendica* Cl. Am 8. 5. bei Crussy 1 Pärchen in Copula, am 20. 5. 1 ♂ an einer Laterne ebenda.
3. *Spilosoma menthastri* Esp. Am 20. 5. 1 ♂ an einer Laterne bei Crussy.
4. *Phragmatobia fuliginosa* L. Die Ende 4. überall vorhandenen Raupen ergaben die Falter vom 7. 5. an.
5. *Arctia caja* L. Bis zum 21. 5. überall einzeln die Raupen.
6. *Euchelia jacobaeae* L. Am 12. 5. das erste Stück an einer Laterne, am 17. und 18. 5. einzeln im Garennewald frisch geschlüpft an Grashalmen, vom 25. 5. an überall im Gras bei Iges und im Garennewald.
7. *Lithosia sororcula* Hufn. Am 20. 5. ein Stück.
8. *Ino statites* L. Am 28. 5. ein Exemplar im Garennewald.
9. *Epichnopteryx pulla* Esp. Ende 4. krochen die Raupen bei Crussy überall zur Verpuppung an Stämmen herauf. Die ersten ♂♂ schlüpften am 25. 5.
10. *Hepialus lupulinus* L. Je ein ♂ am 18. und 25. 5.

Verzeichnis

neu beschriebener Schmetterlingsformen und Jugendzustände tropischer Lepidopteren von meiner

Columbien-Reise (1908—12).

Von A. H. Fassl, Teplitz

(Fortsetzung.)

- Lissochl. viridifimbria* Dgn. ♂♀ Wie vorig.; XVIII, 1910.
- Melochlora inquilina* Dgn. ♂ Wie vorig.
- Miantonota imitans* Warr. ab. *versiplaga* Dgn. ♂ Wie vorig.
- Gelasma diluta* Dgn. ♂ Wie vorig.
- Ochyria neocosma* Dgn. ♂♀ Wie vorig.

Rhinura populonia Druce ab. *obscurior* Dgn. ♂ Wie vorig.

Eois internexa Dgn. ♀ Wie vorig.

Metienulodes periculosaria Oberth. var. *caliginosa* Dgn. ♂♀ Wie vorig.; XXII, 1913.

Metienul. propinqua Dgn. ♂ Wie vorig.

Metienul. ochreicosta Dgn. ♂ Wie vorig.

Leucolithodes fumifascia Dgn. ♂ Wie vorig.

Leucolith. melanoglypha Dgn. ♀ Wie vorig.

Simopteryx obliquilinea columbensis Dgn. ♂♀ Wie vorig.

Apiciopsis albilinea Dgn. ♂ Wie vorig.

Falcenopsis Dgn. (gen. nov.) *grandirena* Dgn. ♂ Wie vorig.

Falcenul. grandirena ab. *multistriata* Dgn. ♂ Wie vorig.

Bagodares tenebrosa Dgn. ♂ Wie vorig.

Rhopalista semiflava Dgn. ♂♀ Wie vorig.

Hydriomena nipteroides Dgn. ♂♀ Wie vorig.

Hydriom. albipulverata Dgn. ♂♀ Wie vorig.

Heterephyra testacea Dgn. ♀ Wie vorig.

Gnemodes vinodiscata Dgn. ♂ Wie vorig.

Phyllodonta muselinea Dgn. ♂ Wie vorig.; Fascie. III, Okt. 1911.

Mixopsis conferta Dgn. ♂ Wie vorig.

Melinodes dentilinea Dgn. ♂ Wie vorig.

Phrudocentra (?) *nigromarginata* Dgn. ♂ Wie vorig.; Fascie. IV, Dez. 1911.

Synelys nigricosta Dgn. ♂ Wie vorig.

Tricentra unimacula Dgn. ♂ Wie vorig.

Ptychopoda simililinea Dgn. ♂ Wie vorig.

Ptychop. simililinea var. *margarita* Dgn. ♂ Wie vorig.

Ptychop. flavimorsa Dgn. ♂ Wie vorig.

Ptychop. sulphuraria Warr. var. *notata* Dgn. ♂ Wie vorig.; XIX, 1912.

Janarda purpureomarginata Dgn. ♂ Wie vorig.

Hammaptera semifasciata Dgn. ♂ Wie vorig.

Hammapt. irrelata Dgn. ♂ Wie vorig.; LVII, 1913.

Anticlea mixticolor Dgn. ♂ Wie vorig.

Antiel. flexuosa Dgn. ♂♀ Wie vorig.

Berambe substriata Dgn. ♂ Wie vorig.

Hirtheistes Dgn. (gen. nov.) *laniata* Dgn. ♂ Wie vorig.

Hyriogona flavicosta Dgn. ♂ Wie vorig.

Mychonina graphica Warr. ab. *fleximargo* Dgn. ♂ Wie vorig.; LIII, 1909.

Catoria multipunctata Dgn. ♂ Wie vorig.

Haemalea sericea Dgn. ♀ Wie vorig.; Annal. Soc. Ent. Belg., Jahrg. XXIV, 1910.

Emmittis costipunctata Dgn. ♂ Wie vorig.

Callipseustes curvilinea Dgn. ♂ Wie vorig.

Darna latimargo Dgn. ♂♀ Wie vorig.; XIX, 1912.

Oporinia subnitida Dgn. ♂ Wie vorig.

Uranidae.

Anorthodisea Dgn. (gen. nov.) *florelineata* Dgn. ♂ Het. Nouv. par PAUL DOGNIN; Mém. Soc. Ent. Belg. XIX, 1912.

Anorthod. albimacula Dgn. ♂ Wie vorig.; Fascie. III, Okt. 1911.

Anorthod. albimacula ab. *impicta* Dgn. ♂ Wie vorig.

Anorthod. caesia Dgn. ♂ Wie vorig.

Psamathia ochriplaga ♀ Wie vorig.; XXII, 1913.

Sieculodopsis semifasciata Dgn. ♂ Wie vorig.; Fascie. IV, Dez. 1911. (Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1917

Band/Volume: [34](#)

Autor(en)/Author(s): Warnecke Georg Heinrich Gerhard

Artikel/Article: [Verzeichnis im Frühjahr 1916 bei Sedan \(Ardennen\) beobachteter Heteroceren. 46](#)